

产我国台湾。模式标本采自台湾。

6. 多穗姜(新拟)

Zingiber pleiostachyum K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 185. 1904.

纤细草本，株高 50 厘米。叶片长圆形或长圆状披针形，长 9—15 厘米，宽 3—4.5 厘米，两面均无毛；叶柄长 3—6 毫米；叶舌 2 裂，长 6 毫米，无毛。花序很多，总花梗长 4—7 厘米，呈“之”字形，无毛，上有 5—6 枚长圆状披针形的鞘；穗状花序有花 4—6 朵；苞片线状披针形，长 3 厘米，无毛；小苞片旋卷；花红色，有长 6—7 毫米、被绢毛的小花梗；花萼长 1.8 厘米，一侧开裂；花冠管极纤细，长 3.8 厘米，裂片长约 2 厘米；唇瓣近菱形，长约 2.4 厘米，侧裂片长 6 毫米，稍锐尖；花药与药隔附属体各长 1.1 厘米。

产我国台湾。模式标本采自台湾。

据原著者称，本种苞片极狭，花有被绢毛的小花梗，极易与近缘种区别。

7. 红冠姜(新拟)

Zingiber roseum (Roxb.) Rosc. in Trans. Linn. Soc. 8: 348. 1807; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 244. 1892; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20(IV. 46): 184. 1904.——*Amomum roseum* Roxb., Corom., Pl. t. 126. 1798.

株高达 1.5 米。叶片长圆形或长圆状披针形，长约 30 厘米，宽 3—5 厘米，叶面无毛，叶背被长柔毛，无柄；叶舌膜质，2 裂，长达 3.5 厘米。总花梗极短，穗状花序稠密，头状，长达 6 厘米；苞片红色，外面的阔卵形，里面的卵状披针形，长 3.5—4.5 厘米；花萼绿色，长 1.5 厘米；花冠管白色，长 2 厘米，裂片披针形，淡红色；唇瓣长圆状楔形，略较花冠裂片为短，白色，边缘卷曲、皱褶；侧裂片极短，圆形，黄色；雄蕊弯拱形，药隔附属体与花药等长。花期：秋。

产云南西南部(德宏自治州)；生于疏林中潮湿之处，海拔 940 米。印度也有分布。

本种叶舌极长，很容易和近缘种区别开来。

8. 匙苞姜(植物分类学报)

Zingiber cochleariforme D. Fang, 植物分类学报 18: 225. 1980.

根茎肥厚，块状，淡黄色，具辛辣味，常有块根。株高 0.7—2 米；叶片椭圆状披针形，稀近长圆形，长 35—48 厘米，宽 8—14 厘米，顶端渐尖，基部楔形至圆楔形，叶面无毛，密被紫褐色腺点，叶背疏被贴伏的长柔毛和腺点；无柄或具长 4—6 毫米的短柄，被长柔毛；叶舌 2 深裂至 2 全裂，长 4—7(14) 毫米，膜质，无毛或被疏毛。穗状花序卵形至倒卵形，长 3—6 厘米，宽 1.5—5 厘米；总花梗长 1—6 厘米，柔弱，被长柔毛；苞片紫色或白色，楔状匙形至长圆形，顶端截平或圆形，长 1.5—4 厘米，宽 0.5—2 厘米，外被柔毛；小苞片一侧开裂至基部，长 2.2—2.8 厘米；花无梗；花萼淡黄色，长 1—1.3 厘米，一侧浅裂；花冠管长 3.5—4 厘米，裂片披针形，黄白色，长约 2.5 厘米，宽约 5 毫米；唇瓣黄白色，长约