

5. 美人蕉(枫腮小牍)

Canna indica L., Sp. Pl. 1. 1753, excl. Pl. Afr. & Amer.; Lour., Fl. Cochinch. 10. 1790; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 6: 139. 1906; 侯宽昭, 广州植物志 671. 1956.—*C. indica* L. var. *rubra* Aiton, Hort. Kew 1: 1. 1789; Nakai in Journ. Jap. Bot. 17: 194. 1941.—*C. chinensis* Willd. in Ges. Naturf. Freunde Berlin 2: 170. 1808. excl. syn. et Hort. Berol. I. 2.; Kranz. in Engl. Pflanzenr. 56 (IV. 47): 46. 1912; Hand.-Mazz., Symb. Sinc. 7: 1323. 1936.—*C. orientalis* Rosc., Monandr. Pl. t. 12. 1828; Kranz. in Engl. Pflanzenr. 56 (IV. 47): 47. 1912.—*C. indica* L. var. *orientalis* Rosc. apud Baker in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 260. 1892.

植株全部绿色, 高可达 1.5 米。叶片卵状长圆形, 长 10—30 厘米, 宽达 10 厘米。总状花序疏花; 略超出于叶片之上; 花红色, 单生; 苞片卵形, 绿色, 长约 1.2 厘米; 萼片 3, 披针形, 长约 1 厘米, 绿色而有时染红; 花冠管长不及 1 厘米, 花冠裂片披针形, 长 3—3.5 厘米, 绿色或红色; 外轮退化雄蕊 3—2 枚, 鲜红色, 其中 2 枚倒披针形, 长 3.5—4 厘米, 宽 5—7 毫米, 另一枚如存在则特别小, 长 1.5 厘米, 宽仅 1 毫米; 唇瓣披针形, 长 3 厘米, 弯曲; 发育雄蕊长 2.5 厘米, 花药室长 6 毫米; 花柱扁平, 长 3 厘米, 一半和发育雄蕊的花丝连合。蒴果绿色, 长卵形, 有软刺, 长 1.2—1.8 厘米。花果期: 3—12 月。

我国南北各地常有栽培。原产印度。

本种花较小, 主要赏叶。

根茎清热利湿, 舒筋活络; 治黄疸肝炎, 风湿麻木, 外伤出血, 跌打, 子宫下垂, 心气痛等。茎叶纤维可制人造棉、织麻袋、搓绳, 其叶提取芳香油后的残渣还可做造纸原料。

5a. 黄花美人蕉

var. *flava* Roxb., Fl. Ind. ed. Willd. 1: 1. 1820; T. Nakai in Journ. Jap. Bot. 17 (4): 195. 1941.—*C. orientalis* Rosc. var. *flava* Rosc., Monandr. Pl. t. 13. 1828.—*C. flavescens* Link, Handb. 1: 226. 1829.—*C. indica* L. var. *flava* Rosc. apud Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 261. 1892.

花冠、退化雄蕊杏黄色与正种不同。

广州有栽培。印度、日本亦有分布。

6. 蕉芋(广东) 姜芋(广东) 图版 55: 3—4

Canna edulis Ker in Bot. Reg. 9: t. 775. 1823; Curtis' Bot. Mag. t. 2498. 1823; Kranz. in Engl. Pflanzenr. 56 (IV. 47): 64. 1912; 侯宽昭, 广州植物志 672. 1956; Back. et al., Fl. Java 3: 77. 1968

根茎发达, 多分枝, 块状; 茎粗壮, 高可达 3 米。叶片长圆形或卵状长圆形, 长 30—60 厘米, 宽 10—20 厘米, 叶面绿色, 边绿或背面紫色; 叶柄短; 叶鞘边缘紫色。总状花序单