

毛；花序轴无毛；花稍密集，着生于花序轴的凹陷处；苞片近圆形，盾状，具短柄，直径约 0.5 毫米；花药圆形，具纤细的花丝；子房椭圆形，粗糙，有腺点，直径约 0.6 毫米，顶端略尖。花期 5—7 月。

产于广西(都安、天峨、凌云、靖西、龙州)、贵州和云南。生于密林下或荫湿岩石上。模式标本采自贵州。

3. 柬埔寨草胡椒(新拟) 东亚细穗草胡椒(海南植物志)

Peperomia leptostachya Hook. et Arn. var. *cambodiana* (C. DC.) Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 58. 1927; 陈焕镛等, 海南植物志 1: 336. 1964.——*Peperomia leptostachya* Hook. et Arn. form. *cambodiana* C. DC. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 64. 1910.——*Peperomia harmandii* sensu Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 58. 1927. non C. DC.

肉质草本，高 20—30 厘米；茎上部直立，下部匍匐，密被短柔毛。叶纸质，对生或 3—4 片轮生，有腺点，倒卵形或倒披针形，稀近圆形，长 2.5—4 厘米，宽 1—2.5 厘米，顶端钝或圆，基部楔形，两面均被短柔毛；叶脉 3—5 条，基出，如为 5 脉时，则最外 1 对不明显；叶柄长 5—12 毫米，密被短柔毛。穗状花序单生或簇生，顶生和腋生，细弱，长约 6 厘米，直径 0.5—0.8 毫米；总花梗被毛，花序轴无毛；花密集；苞片近圆形，盾状，有腺点；花药长圆形，花丝极短；子房倒卵形，顶端微凹，柱头多乳头状凸起，着生于子房顶端凹陷处。浆果球形，直径约 0.5 毫米。花期 6—10 月。

产于广东南部(海南)。生于密林下或阴湿的石缝中。越南北部也有。


4. 石蝉草(广东) 散血胆(云南中草药选) 图版 24: 5—7

Peperomia dindygulensis Miq. Syst. Pip. 122. 1843; C. DC. in DC. Prodr. 16: 442. 1868; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 98. 1886; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 38. 1940; 中国科学院植物研究所, 中国高等植物图鉴 1: 345. 1972.

肉质草本，高 10—45 厘米；茎直立或基部匍匐，分枝，被短柔毛，下部节上常生不定根。叶对生或 3—4 片轮生，膜质或薄纸质，有腺点，椭圆形、倒卵形或倒卵状菱形，下部的有时近圆形，长 2—4 厘米，宽 1—2 厘米，顶端圆或钝，稀短尖，基部渐狭或楔形，两面被短柔毛；叶脉 5 条，基出，最外 1 对细弱而短或有时不明显；叶柄长 6—18 毫米，被毛。穗状花序腋生和顶生，单生或 2—3 丛生，长 5—8 厘米，直径 1.3—2 毫米；总花梗被疏柔毛，长 5—15 毫米；花疏离；苞片圆形，盾状，有腺点，直径约 0.8 毫米；雄蕊与苞片同着生于子房基部，花药长椭圆形，有短花丝；子房倒卵形，顶端钝，柱头顶生，被短柔毛。浆果球形，顶端稍尖，直径 0.5—0.7 毫米。花期 4—7 月及 10—12 月。

产于我国台湾经东南至西南部各省区。生于林谷、溪旁或湿润岩石上。印度至马来西亚均有。

全草药用，有散瘀消肿、止血等效能，治跌打刀伤、烧烫伤等。



1—4. 硬毛草胡椒 *Peperomia cavaleriei* C. DC.: 1. 花枝; 2. 花序一段; 3. 雄蕊; 4. 果。5—7. 石蜂草 *Peperomia dindygulensis* Miq.: 5. 花枝; 6. 苞片; 7. 果。8—9. 草胡椒 *Peperomia pellucida* (Linn.) Kunth: 8. 花枝; 9. 果。(黄少容、余汉平、邓晶发绘)