

组 1. 胡桃组——*Sect. 1. Juglans* ——*Dioscaryon* Dode in Bull. Soc. Dendr. France 2: 72. 1906.

芽被有黑色茸毛。羽状复叶具小叶 5—11 枚；幼植株上的小叶常具锯齿，但成长植株的小叶则为全缘，无毛或被短柔毛。雌花序短而具少数雌花，花药无毛。果实无毛或被稀疏短柔毛；果核基部不完全 4 室。

1. 胡桃(通称) 核桃(通称) 图版 9: 7—10

Juglans regia L., Sp. Pl. 997. 1753.—*J. regia* L. var. *sinensis* C. DC. in Ann. Sci. Nat. Sér. 4, 18: 33. 1862.—*J. duclouxiana* Dode in Bull. Soc. Dendr. France 2: 81. 1906.—*J. orientis* Dode l. c. 91.—*J. sinensis* (C. DC.) Dode l. c. 92.

乔木，高达 20—25 米；树干较别的种类矮，树冠广阔；树皮幼时灰绿色，老时则灰白色而纵向浅裂；小枝无毛，具光泽，被盾状着生的腺体，灰绿色，后来带褐色。奇数羽状复叶长 25—30 厘米，叶柄及叶轴幼时被有极短腺毛及腺体；小叶通常 5—9 枚，稀 3 枚，椭圆状卵形至长椭圆形，长约 6—15 厘米，宽约 3—6 厘米，顶端钝圆或急尖、短渐尖，基部歪斜、近于圆形，边缘全缘或在幼树上者具稀疏细锯齿，上面深绿色，无毛，下面淡绿色，侧脉 11—15 对，腋内具簇短柔毛，侧生小叶具极短的小叶柄或近无柄，生于下端者较小，顶生小叶常具长约 3—6 厘米的小叶柄。雄性葇荑花序下垂，长约 5—10 厘米、稀达 15 厘米。雄花的苞片、小苞片及花被片均被腺毛；雄蕊 6—30 枚，花药黄色，无毛。雌性穗状花序通常具 1—3 (—4) 雌花。雌花的总苞被极短腺毛，柱头浅绿色。果序短，俯垂，具 1—3 果实；果实近于球状，直径 4—6 厘米，无毛；果核稍具皱纹，有 2 条纵棱，顶端具短尖头；隔膜较薄，内里无空隙；内果皮壁内具不规则的空隙或无空隙而仅具皱纹。花期 5 月，果期 10 月。


产于华北、西北、西南、华中、华南和华东。分布于中亚、西亚、南亚和欧洲。生于海拔 400—1800 米之山坡及丘陵地带，我国平原及丘陵地区常见栽培，喜肥沃湿润的沙质壤土，常见于山区河谷两旁土层深厚的地方。种仁含油量高，可生食，亦可榨油食用；木材坚实，是很好的硬木材料。

由于栽培已久，品种很多；我国所产亦有许多品种。*Dode* 所命名的那些种类，多有不可区分的中间类型存在或所依据的特征不够稳定或者区别过小，不足以成为独立种的特征，如云南省所产的薄壳核桃，*Dode* 命名为 *J. duclouxiana*，看来只能认为是胡桃的一个栽培品种。

2. 泡核桃 漾濞核桃、茶核桃(云南)，铁核桃(四川、云南)

Juglans sigillata Dode in Bull. Soc. Dendr. France 2: 94. 1906.

乔木，树皮灰色，浅纵裂；小枝青灰色，有白色皮孔，二年生枝色稍深。冬芽卵圆形，芽鳞有短柔毛。单数羽状复叶，稀顶生小叶退化，长 15—50 厘米，叶轴及叶柄有黄褐色短柔



1—4.野核桃 *Juglans cathayensis* Dode: 1.核; 2.叶背面的一部分; 3.雄花序(未伸出); 4.果核。
5—6.胡桃楸 *J. mandshurica* Maxim.: 5.果序; 6.果核。
7—11.胡桃 *J. regia* L.: 7.果核; 8.果核侧面观; 9.果核纵切观; 10.果核横切观; 11.叶。(张泰利绘)