

锯齿，不分裂或3—5裂，小树之叶常有明显分裂，表面粗糙，疏生糙毛，背面密被绒毛，基生叶脉三出，侧脉6—7对；叶柄长2.5—8厘米，密被糙毛；托叶大，卵形，狭渐尖，长1.5—2厘米，宽0.8—1厘米。花雌雄异株；雄花序为柔荑花序，粗壮，长3—8厘米，苞片披针形，被毛，花被4裂，裂片三角状卵形，被毛，雄蕊4，花药近球形，退化雌蕊小；雌花序球形头状，苞片棍棒状，顶端被毛，花被管状，顶端与花柱紧贴，子房卵圆形，柱头线形，被毛。聚花果直径1.5—3厘米，成熟时橙红色，肉质；瘦果具与等长的柄，表面有小瘤，龙骨双层，外果皮壳质。花期4—5月，果期6—7月。

产我国南北各地。锡金、缅甸、泰国、越南、马来西亚、日本、朝鲜也有，野生或栽培。

本种韧皮纤维可作造纸材料，精实子及根、皮可供药用。

2. 楮（名医别录） 小构树（秦岭） 图版7：6—8

Broussonetia kazinoki Sieb. in Verh. Bot. Genoot. 7: 28. 1830; Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. 221. 1846; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 490. 1890; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 305. 1912; Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 111. f. 35, 36. 1932, excl. syn.; 陈嵘，中国树木分类学，233. 1937; Makino, New Ill. Fl. Japan 96. f. 381. 1961; 中国高等植物图鉴 1: 481. 1972, pp. excl. f.; 台湾植物志 2: 120. excl. pl. 234. 1976; 湖北植物志 1: 431. 1976, excl. f.; 湖北植物大全, 266. 1992; 横断山维管植物, 上册: 303. 1993; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16(4): 56. 1994. *B. Kazinoki* Sieb. var. *ruyangensis* P. H. Ling et X. W. Wei in Guihaia 2 (1): 155. 1982, syn. nov.


灌木，高2—4米；小枝斜上，幼时被毛，成长脱落。叶卵形至斜卵形，长3—7厘米，宽3—4.5厘米，先端渐尖至尾尖，基部近圆形或斜圆形，边缘具三角形锯齿，不裂或3裂，表面粗糙，背面近无毛；叶柄长约1厘米；托叶小，线状披针形，渐尖，长3—5毫米，宽0.5—1毫米。花雌雄同株；雄花序球形头状，直径8—10毫米，雄花花被4—3裂，裂片三角形，外面被毛，雄蕊4—3，花药椭圆形；雌花序球形，被柔毛，花被管状，顶端齿裂，或近全缘，花柱单生，仅在近中部有小突起。聚花果球形，直径8—10毫米；瘦果扁球形，外果皮壳质，表面具瘤体。花期4—5月，果期5—6月。

产台湾及华中、华南、西南各省区。多生于中海拔以下，低山地区山坡林缘、沟边、住宅近旁。日本、朝鲜也有分布。

韧皮纤维可以造纸。

3. 葡萄（日名） 藤葡萄（浙江植物志）

Broussonetia kaempferi Sieb. in Verh. Bat. Genoot. 12: 28. 1830; Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. 221. 1846; Bur. in DC. Prodr. 17: 225. 1873; Nakino, New Ill. Fl. Japan: 96, f. 382. 1961; Ohwi, Fl. Japan rev. ed. 501. 1965; Kitam. et Murata, Col. Ill. Woody Pl. Japan 2: 245. f. 352—8, 9, pl. 113—698. 1979.



图版 7 1—5. 构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hert. et Vent. : 1. 雄花枝, 2. 雌花枝, 3. 雄花, 4. 雌花, 5. 叶背面一部分。6—8. 糖构 *B. kazinoki* Sieb. : 6. 雄花枝, 7—8. 雄花, 9—13. 蕤构 *B. kaempferi* Sieb. var. *australis* T. Suzuki: 9. 雌花枝, 10. 雄花枝, 11. 叶背面, 12. 雌花, 13. 雄花。 (张培英绘)