

F. heterostyla Merr. in Journ. Arn. Arb. **23**: 158, 1942. — *F. compressa* S. S. Chang in Guihaia **3** (4): 295, 1983, syn. nov.

本变种榕果扁球形，径25—30毫米，成熟时黄色，干后常具纵棱，口部苞片连座状，侧生苞片宽三角形，总梗长5—10毫米。

产广西（宁明，弄岗石达自然保护区）。分布于越南（北部至中部）、老挝。

模式采自越南北部三位山（Petelot 5664，即 *F. heterostyla* Merr.）。

82. 棱果榕（新拟） 图版 48: 1—4

Ficus septica Burm. f. Fl. Ind. 226. 1768; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta **1**: 119. t. 157. 1888; Kanehira, Form. Trees. rev. ed. 161, f. 110. 1936; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 27. f. 16, 17. 1944; Li, Woody Fl. Taiwan 116. 1963; Corner in Gard. Bull. Sing. **21**: 96. 1965; Hatusima, Fl. Ryukyus: 230. 1971; 台湾植物志 **2**: 148, pl. 244. 1976; Kitam. ex Murata, Col. Ill. Woody Pl. Jap. **2**: 239. 1979; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. **31** (1): 15. 1983. — *F. haulii* Blanco, Fl. Filippin. ed. 684. 1837; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan **2**: 726. f. 580. 1962. — *F. oldhami* Hance Advers. in Stirp. Crt. 1870; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersh. **11**: 344. 1870.

乔木或灌木状大树，树皮浅褐或黄褐色，有皱纹或疤痕，枝多粗壮，圆柱形，叶膜质，长圆形或卵状椭圆形至倒卵形，长15—26厘米，宽10—14厘米，全缘，幼时被柔毛，先端渐尖或短尖，有时为短尾尖，基部宽楔形，基出侧脉3—5条，短，侧脉6—12对；叶柄长2—8厘米；托叶膜质，红色，卵状披针形，长2—3厘米。榕果无侧生苞片，单生或成对腋生或茎花，扁球形，宽1.2—2.5厘米，绿色或浅褐色，表面散生白色球形或椭圆形瘤体和白色细小斑点，有纵脊8—12条，成熟顶部开裂，基生苞片3枚，宽卵圆形，边缘反卷，总梗长6—13毫米；雄花和瘿花同生于一榕果内壁，雄花少数，生于近口部，花被片2—3，基部合生，雄蕊1，花丝短，花药椭圆形；瘿花，有长柄，花被短，透明，顶部稍被毛，子房卵形至近球形，光滑，花柱很短，侧生或近顶生，柱头膨大；雌花，具长柄，花被顶部有2—3齿牙。瘦果斜卵形或近球形，花柱侧生，长，顶部有透明柔毛，柱头棒状。 花果期4—5月。

产我国台湾（台北、屏东）。日本琉球、菲律宾、印度尼西亚（广布）、巴布亚新几内亚至所罗门群岛及澳大利亚东北部（昆士兰）也有分布。通常栽于庭园。模式标本采自台湾。

83. 水同木（海南植物志） 图版 48: 8—9

Ficus fistulosa Reinw. ex Bl. Bijdr. 442. 1825; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 525. 1888; Craib, Contr. Fl. Siam. Dicots. 195. 1912; Ridl. Fl. Mal. Pen. **3**: 343. 1942; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **5**: 817. 1928; Corner in Dansk Bot. Ark.



图版 48 1—4. 榕果榕 *Ficus septica* Burm. : 1. 果枝, 2. 榕果, 3. 雌花, 4. 雄花示雄蕊。
 5—7. 肉托榕 *F. squamosa* Roxb. ; 5. 果枝, 6. 叶背面, 7. 雌花。8—9. 水同木 *F. fistulosa*
 Reinw. ; 8. 果枝, 9. 叶。 (张培英绘)