

Ill. Woody Pl. Jap. 2: 241, f. 693. 1979; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. 3 (1): 10. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 707. 1984; 浙江植物志 2: 94, f. 2—124. 1992; 湖北植物大全: 268. 1992. Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 61. 1994. — *F. stipula* Thunb. Dissert. Ficus 8. 1786. — *F. hanceana* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 11: 341. 1883.

92a. 薜荔 (原变种) 图版 52: 1—5

***Ficus pumila* Linn. var. *pumila***

攀援或匍匐灌木, 叶两型, 不结果枝节上生不定根, 叶卵状心形, 长约 2.5 厘米, 薄革质, 基部稍不对称, 尖端渐尖, 叶柄很短; 结果枝上无不定根, 革质, 卵状椭圆形, 长 5—10 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端急尖至钝形, 基部圆形至浅心形, 全缘, 上面无毛, 背面被黄褐色柔毛, 基生叶脉延长, 网脉 3—4 对, 在表面下陷, 背面凸起, 网脉甚明显, 呈蜂窝状; 叶柄长 5—10 毫米; 托叶 2, 披针形, 被黄褐色丝状毛。榕果单生叶腋, 瘦花果梨形, 雌花果近球形, 长 4—8 厘米, 直径 3—5 厘米, 顶部截平, 略具短钝头或为脐状凸起, 基部收窄成一短柄, 基生苞片宿存, 三角状卵形, 密被长柔毛, 榕果幼时被黄色短柔毛, 成熟黄绿色或微红; 总梗粗短; 雄花, 生榕果内壁口部, 多数, 排为几行, 有柄, 花被片 2—3, 线形, 雄蕊 2 枚, 花丝短; 瘦花具柄, 花被片 3—4, 线形, 花柱侧生, 短; 雌花生另一植株榕果内壁, 花柄长, 花被片 4—5。瘦果近球形, 有粘液。 花果期 5—8 月。

产福建、江西、浙江、安徽、江苏、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南东南部、四川及陕西。北方偶有栽培。日本 (琉球)、越南北部也有。

瘦果水洗可作凉粉, 藤叶药用。


92b. 爱玉子 (变种) (台湾) 图版 52: 6—8

***Ficus pumila* Linn. var. *awkeotsang* (Makino) Corner in Gard. Bull. Sing. 18: 6. 1960, in ibid. 21: 52. 1965; 台湾植物志 2: 145, pl. 243, 1976; 浙江植物志 2: 94. 1992—*F. awkeotsang* Makino in Bot. Mag. Tokyo 18: 151. f. 1—3. 1904; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 149. f. 94. 1936; Sata, Monogr. Ficus Form and Philip. 43. f. 1, 2, 38. 1944; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan 2: 711. f. 565. 1962; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. 31 (L): 10. 1983. — *Ficus nagayamai* Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Formos. 3: 14. 1927.**

叶长椭圆状卵形, 长 7—12 厘米, 宽 3—5 厘米, 背面密被锈色柔毛; 榕果长圆形, 长 6—8 厘米, 直径 3—4 厘米, 表面被毛, 顶部渐尖, 脐部凸起; 总梗短, 长约 1 厘米, 密被粗毛。

产台湾 (模式产地, 但多栽培)、福建、浙江 (乐清、北雁荡山)。果可食。

93. 匍茎榕 (西藏植物志)



图版 52 1—5. 薛荔 *Ficus pumila* Linn. : 1. 果枝, 2. 不育枝, 3. 瘦花, 4. 雄花, 5. 叶背面。  
 6—8. 爱玉子 *F. pumila* Linn. var. *awkeotsang* (Makino) Corner. : 6. 叶枝, 7 榕果, 8. 叶背面。  
 (张培英绘)