

一个变种。

3. 大麻亚科 Subfam. CANNABIOIDEAE

Engl. Prodr. Fl. Norf. 39. 1933.

草本。无乳液。花为聚伞花序或集合为圆锥花序。

11. 葎草属 *Humulus* Linn.

Linn. Sp. Pl. 1: 1028. 1753; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 691. 1928; Engler et Diels, Syllabus der Pflanzenfam. 184. 1936.

一年生或多年生草本，茎粗糙，具棱。叶对生，3—7裂。花单性，雌雄异株；雄花为圆锥花序式的总状花序；花被5裂，雄蕊5，在花芽时直立，雌花少数，生于宿存覆瓦状排列的苞片内，排成一假柔荑花序，结果时苞片增大，变成球果状体，每花有一全缘苞片包围子房，花柱2。果为扁平的瘦果。

本属3种，主要分布北半球温带及亚热带地区。我国产3种，主要分布于东南部和西南部。

分种检索表

1. 叶肾状五角形，掌状深裂为5—7裂、稀3裂；果穗长0.5—1.5厘米；苞片纸质，被白色绒毛；瘦果成熟时露出苞片外 1. 葎草 *H. scandens* (Lour.) Merr.
 1. 叶全缘或3—5裂；果穗长约3—7厘米；苞片干膜质，近无毛；瘦果成熟时包于苞片内。
 2. 叶背面疏生柔毛或腺点，卵形或宽卵形，长4—11厘米，宽约4—8厘米，先端急尖；果穗近圆形，径约3—5厘米；苞片卵形，长约1厘米，无隆起网脉。 2. 啤酒花 *H. lupulus* Linn.
 2. 叶背面被绒毛，卵形或3裂，长5—14厘米，宽4—13厘米，先端渐尖；果序为穗状，长3—7厘米；苞片卵状，长圆形，长1.5—3厘米，具隆起网脉 滇葎草 *H. yunnanensis* Hu
1. 葎草 (唐本草) 勒草 (名医别录)，葛勒子秧 (救荒本草)，拉拉藤 (江苏、浙江)，锯锯藤 (四川、江西) 图版 57: 5—7

Humulus scandens (Lour.) Merr. in Trans. Amer. Philip. Soc. n. ser. 24. —2; 138. 1935; 中国高等植物图鉴 1: 502. f. 1004. 1972; 台湾植物志 2: 157. 1976; 云南植物志 1: 158. 1977. — *Antidesma scandens* Lour. Fl. Cochinch. 2: 157. 1790. — *Humulus japonicus* Sieb. et Zucc. Fl. Japan Fam. Nat. 2: 89. 1849.