

in Acta Bot. Yunnan. 3 (3); 317. 1981.

1a. 腋球苧麻 (原变种)

B. malabarica Wedd. var. malabarica

灌木, 高 3—5 米; 当年生枝密被开展和近贴伏的短柔毛。叶互生, 同一对叶等大或不等大; 叶片椭圆状卵形或椭圆形, 长 (4.7—) 9—19 厘米, 宽 (2.5—) 4.2—8 厘米, 顶端渐尖或尾状渐尖, 基部圆形或钝, 边缘在基部之上有多数尖或钝的小牙齿, 上面稍粗糙, 有短伏毛, 下面沿脉网有密或疏的短柔毛, 基出脉 3 条, 侧脉 3—4 对; 叶柄长 (0.7—) 2.5—7 厘米, 密被开展和近贴伏的短柔毛。团伞花序腋生, 单性, 直径 2—7 毫米, 雌的生小枝顶部, 有少数苞片, 雄的生于其下, 有多数苞片; 苞片卵形、三角形或钻形, 长达 1 毫米, 背面有柔毛。雄花: 花梗长约 0.5 毫米; 花被片 4, 船状宽椭圆形, 长约 1.2 毫米, 宽约 0.9 毫米, 外面上部疏被短毛; 雄蕊 4, 长约 1.6 毫米, 花药宽卵形, 长约 0.8 毫米; 退化雌蕊椭圆形, 长约 0.7 毫米, 基部有少数毛。雌花: 花被狭椭圆形, 长约 1 毫米, 顶端有 2 小齿, 外面密被柔毛; 子房长约 0.4 毫米, 柱头长约 1.4 毫米。花期 11 月。

产云南南部、西藏东南部, 生于海拔 850—1 000 米间山地混交林中或林边。锡金、印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、越南、印度尼西亚也有分布。

1b. 光枝苧麻 (云南植物研究) (变种)

B. malabarica Wedd. var. leioclada (W. T. Wang) W. T. Wang, comb. nov. —
B. glomerulifera Miq. var. *leioclada* W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (3); 318. 1981.

与腋球苧麻的区别: 当年生小枝及叶柄无毛或上部有疏伏毛; 叶上面无毛; 花雌雄异株; 小坚果褐色, 狭倒卵形, 长约 1.2 毫米, 光滑。

产云南南部。生于山谷林中或沟边, 海拔 950—1 400 米。模式标本采自普文。


2. 光叶苧麻 (云南植物研究) 图版 77: 5—6 (见 347 页)

Boehmeria leiophylla W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (3); 318. 1981; 云南种子植物名录, 上册, 714. 1984.

灌木, 高 3—5 米; 小枝只在顶端有短伏毛, 其他部分无毛。叶互生; 叶片纸质, 长椭圆形, 长 7.5—20 厘米, 宽 2.8—6.5 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形或微钝, 边缘有很小的钝牙齿, 两面无毛, 基出脉 3 条, 在下面稍隆起, 侧脉 2 对; 叶柄长 0.5—7 厘米, 疏被短糙伏毛, 通常很快变无毛; 托叶三角形, 长约 4 毫米。雌团伞花序单个腋生, 直径 3—4.5 毫米, 有多数花; 苞片卵状船形, 长约 1.2 毫米。雌花: 花被结果时近倒正三角形, 长约 1.2 毫米, 顶端有 2 小齿, 疏被贴伏的短柔毛; 柱头长约 1 毫米。瘦果宽倒卵球形, 长约 1 毫米, 光滑。花期 4 月。

产云南绿春 (模式产地)。生于山谷中, 海拔约 700 米。

3. 长圆苧麻 (云南植物研究)



图版 77 1—2. 密球苎麻 *Boehmeria densiglomerata* W. T. Wang: 1. 植株上部, 2. 瘦果及宿存花被。
 3—4. 福州苎麻 *B. formosana* var. *fuzhouensis* W. T. Wang: 3. 叶及腋生花序, 4. 瘦果及宿存花被。
 5—6. 光叶苎麻 *B. leiophylla* W. T. Wang: 5. 植株上部, 6. 瘦果及宿存花被。7—8. 盈江苎麻 *B. ingjiangensis* W. T. Wang: 7. 叶及腋生花序, 8. 瘦果及宿存花被。(路桂兰绘)