

3.5—6 (—8) 厘米, 顶端不等二裂 (裂片顶端骤尖), 基部宽楔形或近截形, 边缘在基部之上有粗牙齿, 上面疏被短伏毛, 下面有极稀疏的短毛, 侧脉约 3 对; 叶柄长 2—5.5 厘米。穗状花序腋生, 雌雄异株, 长 1—5 厘米, 不分枝或下部有少数短分枝, 顶端常有 2 叶; 叶披针形, 长 0.5—0.8 厘米; 雌团伞花序直径 1—2 毫米; 苞片三角形或狭三角形, 长达 2.5 毫米。雌花: 花被椭圆形或菱状狭倒卵形, 长 0.5—0.6 毫米, 顶端有 2 小齿, 外面上部有少数毛; 柱头长 0.5—0.8 毫米。 花期 7 月。

产西藏东南部 (易贡、察隅)。生于山地林下或溪边, 海拔 1 650—2 500 米。模式标本采自易贡。

组 5. 大叶苧麻组 Sect. *Duretia* Bl. Mus. Bot. Lugd.-Bot. 2: 212. 1857. — *Boehmeria* subgen. *Duretia* (Bl.) Satake in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. II, 4: 478. 1936.

灌木、亚灌木或多年生草本。叶对生, 稀近轮生或有些互生。团伞花序排列成无叶的穗状花序或圆锥花序。雄花近无梗或具短梗, (三) 四基数。瘦果无柄或具柄, 有时周围具翅。

我国有 22 种。

系 1. 大叶苧麻系 Ser. *Longispicae* (Satake) W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3(4): 401. 1981. — Sect. *Longispicae* Satake in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. II, 4: 521. 1936. — Sect. *Spicatae* Satake, l. c. 480.

叶卵形或近圆形, 稀披针形。穗状花序或圆锥花序通常单个腋生。具果花被椭圆形、倒卵形或宽倒卵形。瘦果无柄, 稀具柄, 无翅。

我国有 18 种。


11. 水苧麻 (中国经济植物志) 水麻、癭蛤蟆棵 (云南) 图版 75: 1—2

*Boehmeria macrophylla* Hornem. Hort. Reg. Bot. Hafn. 2: 890. 1815; Grierson et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 126. 1983. — *B. platyphylla* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 60. 1825; Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 210. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 578. 1888; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 150. 1299; 中国高等植物图鉴 1: 519, 图 1038. 1972; W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (4): 401. 1981. — *Splitgerbera macrostachya* Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 6: 10, t. 1977. 1853. — *Boehmeria platyphylla* var. *macrostachya* (Wight) Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 355. 1856; in DC. Prodr. 16 (1): 211. 1869; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 487. 1899.

11a. 水苧麻 (原变种)

*B. macrophylla* Hornem. var. *macrophylla*

亚灌木或多年生草本; 茎高 1—2 (—3.5) 米, 上部有疏或稍密的短伏毛。叶对生或



图版 75 1—2. 水苎麻 *Boehmeria macrophylla* Hornem. ; 1. 植株一部分, 2. 瘦果及宿存花被。3—4. 糙叶水苎麻 *B. macrophylla* var. *scabrella* (Roxb.) Gaud. ; 3. 叶及腋生花序, 4. 瘦果及宿存花被。5. 疏毛水苎麻 *B. pilosiuscula* (Bl.) Hassk. ; 植株顶部。6. 海岛苎麻 *B. formosana* Hayata, 叶。

(刘春荣绘)