

40 (1); 129. 1982; Grierson et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 127. 1983. *Urtica scabrella* Roxb. Fl. Ind. 3: 581. 1832. — *B. platyphylla* D. Don var. *scabrella* (Roxb.) Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 211. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 578. 1888; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 487. 1899; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 151. 1929; 陈嵘, 中国树木分类学 246. 1937; 广州植物志 401. 1956; W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (4): 402. 1981; 云南种子植物名录, 上册, 715. 1984; 贵州植物志 4: 72. 1989.

与水苎麻的区别: 叶较小, 长 4.5—7 (—10) 厘米, 宽 2—4 (—6.5) 厘米, 上面粗糙, 脉网下陷, 呈泡状, 下面脉网明显隆起; 叶柄较短, 长达 4 厘米。花序常不分枝或有较少分枝。

产西藏东南部、云南、贵州、广西、广东。生于丘陵或低山坡灌丛中、田边或山谷沟边, 海拔 200—1300 米。尼泊尔、不丹、印度、斯里兰卡、印度尼西亚也有分布。

茎皮纤维可造纸、织布、制绳。全草药用, 治风湿痛、毒疮等症。

12. 疏毛水苎麻 (海南植物志) 图版 75: 5


Boehmeria pilosiuscula (Bl.) Hassk. Cat. Hort. Bogor. 79. 1844; Bl. Mus. Bot. Lugd. -Bat. 2: 223. 1856; Li, Woody Fl. Taiwan 133. 1963; Backer et Bakh. Fl. Jav. 2: 45. 1965; T. S. Liu et W. D. Huang in Li, Fl. Taiwan 2: 168. 1976; W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (4): 402. 1981. — *Urtica pilosiuscula* Bl. Bijdr. 491. 1825. — *Boehmeria platyphylla* D. Don var. *pilosiuscula* (Bl.) Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 151. 1929; 海南植物志 2: 414. 1965; 云南种子植物名录, 上册, 715. 1984.

亚灌木或多年生草本, 高 45—60 厘米, 下部近无毛, 上部密被近贴伏或开展的短柔毛。叶对生, 同一对叶不等大; 叶片纸质, 斜椭圆形或椭圆状卵形, 长 2.9—9 厘米, 宽 1.5—4.5 厘米, 顶端渐尖或短渐尖, 基部斜圆形, 边缘有少数小牙齿, 上面稍粗糙, 疏被短伏毛, 下面沿脉网有短柔毛, 侧脉约 3 对; 叶柄长 0.3—3.5 厘米。穗状花序单生叶腋, 雌性或通常两性, 上部生雄花, 其下生雌花, 由于团伞花序彼此密集, 因此整个穗状花序呈圆柱形或棒形, 长 0.8—2 厘米。雄花无梗或有短梗; 花被片 4, 椭圆形, 长约 1 毫米, 下部合生, 外面有疏柔毛; 雄蕊 4, 长约 1.5 毫米, 花药长约 0.5 毫米; 退化雌蕊椭圆形, 长约 0.6 毫米。雌花: 花被纺锤形或狭倒卵形, 长 0.8—1.1 毫米, 顶端有 2 小齿, 外面上部有短毛, 果期呈倒三角形或倒卵形; 柱头与花被近等长。瘦果倒卵球形, 长约 0.8 毫米, 光滑。花期 9—10 月。

产云南海南、海南、台湾。生于山谷溪边、林边或石上, 海拔 700 米 (海南) 或 1100—1500 米 (云南)。泰国、印度尼西亚等地。

13. 越南苎麻 (海南植物志)

Boehmeria tonkinensis Gagnep. in Not. Syst. 4: 127. 1928; in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 843, fig. 97 (18—24), 98 (1). 1929; 海南植物志 2: 415. 1965; 云南



图版 75 1—2. 水苎麻 *Boehmeria macrophylla* Hornem. ; 1. 植株一部分, 2. 瘦果及宿存花被。3—4. 糙叶水苎麻 *B. macrophylla* var. *scabrella* (Roxb.) Gaud. ; 3. 叶及腋生花序, 4. 瘦果及宿存花被。5. 疏毛水苎麻 *B. pilosiuscula* (Bl.) Hassk. ; 植株顶部。6. 海岛苎麻 *B. formosana* Hayata, 叶。

(刘春荣绘)