

种子植物名录,上册,717. 1984. — *B. sidaefolia* auct. non Wedd.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 68. 1927, p. p. excl. McClure 8433.

小灌木,高1—3米;枝条暗紫褐色,被短糙伏毛。叶对生,具柄;叶片长圆形或披针状长圆形,长5—12厘米,宽2—3.2厘米,顶端渐尖,基部钝或宽楔形,边缘有密集小牙齿,表面常粗糙呈泡状,散生短糙毛,背面沿脉被糙伏毛,基出脉3条,侧脉2—3对;叶柄长0.3—2厘米,被短糙伏毛;托叶钻状披针形,长3—8毫米。穗状花序腋生,长4—6厘米,在近基部处有少数分枝;雄团伞花序直径约1.5毫米,雌团伞花序直径3—4毫米;苞片三角形,长约1.2毫米。雄花:花被片4,椭圆形,长约0.8毫米,基部合生,外面被短毛;雄蕊4;退化雌蕊倒卵球形,长约0.3毫米。雌花:花被狭椭圆形,长约0.8毫米,上部被短柔毛,顶端具2小齿,在果期稍增大,椭圆形或宽倒卵形;柱头长约1毫米。瘦果椭圆球形或宽倒卵球形,长约0.9毫米。花期3月。

产云南东南部、海南。生于疏林中。越南北部也有分布。

14. 琼海芒麻 (海南植物志) 乐会芒

Boehmeria lohuiensis Chien in Acta Phytotax. Sin. 8:355. 1963;海南植物志 2:415, 图 495. 1965.

小灌木;小枝疏被短糙伏毛。叶对生,同一对叶不等大;叶片长椭圆形,长6—11(—14)厘米,宽3—4.5(—5.5)厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘有多数小牙齿,上面无毛,下面沿中脉疏被短伏毛,侧脉约2对;叶柄长1—6厘米;托叶钻形,长8—10毫米。穗状花序雌雄异株,长约10厘米,下部有3—5条向上开展的长分枝;雌团伞花序直径1.5—3毫米;苞片卵形或椭圆形,长0.5—1.2毫米。雌花:花被狭卵形,长约0.8毫米,顶端有2小齿,外面有短毛;柱头长约1毫米。瘦果卵球形,长约1毫米。花期8月。

产海南乐东(模式产地)。生于河边疏林中。

15. 海岛芒麻 (海南植物志) 图版 75: 6

Boehmeria formosana Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 281. 1911; Satake in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. III, 4: 490. 1936; 海南植物志 2: 416. 1965; T. S. Liu et W. D. Huang in Li, Fl. Taiwan 2: 165, pl. 251. 1976; 福建植物志 1: 474. 1982; 安徽植物志 2: 127, 图 394. 1987. — *B. platyphylla* var. *stricta* C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 487. 1899. — *B. sieboldiana* auct. non Bl.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 151. 1929; Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 9: 270. 1934.

15a. 海岛芒麻 (原变种)

B. formosana Hayata var. *formosana*

多年生草本或亚灌木;茎高80—150厘米,通常不分枝,上部疏或稍密被短伏毛或无毛。叶对生或近对生;叶片草质,长圆状卵形、长圆形或披针形,长8—15(—21)厘米,宽2.5—6.5(—8)厘米,顶端尾状或长渐尖,基部钝或圆形,边缘在基部之上有多