

产广东(云浮、肇庆)、广西(南丹、河池)。生于丘陵灌丛中,海拔500米左右。模式标本采自广西南丹。

19. 长序苧麻 (云南植物研究)

Boehmeria dolichostachya W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (4): 405. pl. 2 (4). 1981.

亚灌木,高达3米,上部密被糙伏毛。叶对生;叶片近圆形或圆卵形,长6.5—15厘米,宽9—15厘米,顶端突尾状(尾状尖头条状披针形,边缘有1—2小齿或近全缘),基部心形或近心形,边缘有粗牙齿(牙齿长达7—9毫米),上部被糙伏毛,下部密被短糙伏毛,基出脉3条,侧脉2对;叶柄长2.5—10.5厘米,被糙伏毛;托叶钻状三角形,长约5毫米,顶端锐尖,背面被短糙伏毛。雄花序长5—8厘米,有3条分枝;雌花序不分枝,穗状,长17—40厘米;雄团伞花序直径1.5—2毫米,雌团伞花序直径2—3毫米;雄花序苞片三角形,长约1毫米,雌花苞片三角状钻形,长2—3毫米。雄花:花被片4,宽椭圆形,长约1毫米,基部合生,外面上部被短糙伏毛;雄蕊4;退化雌蕊倒卵球形,长约0.3毫米。雌花:花被狭菱形,长约0.8毫米,果期宽菱状倒卵形,长约1.4毫米,顶端具2小齿,外面上部疏被短糙伏毛;柱头长约1.2毫米。瘦果与果期花被同形,长约1.2毫米,光滑。果期10月。

产广西龙州(模式产地)。生于山地林中。

20. 大叶苧麻(江苏南部种子植物手册) 野线麻(安徽),山麻(山东),大蚕婆草、火麻风(四川蓬溪) 图版76: 3—4

Boehmeria longispica Steud. in Flora Regensb. 33: 260. 1850; Bl. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 221. 1857; Satake in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. II, 4: 533, f. 53. 1936; 福建植物志 1: 475. 1982; 安徽植物志 2: 128, 图 395. 1987; 贵州植物志 4: 69. 1989. — *B. grandifolia* Wedd. in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 1: 199. 1854; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 485. 1899; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 151. 1929; Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 9: 144, 266. 1934; 江苏南部种子植物手册 224, 图 346. 1959; 中国高等植物图鉴 1: 518, 图 1036. 1972; 河南植物志 1: 300. 1981. — *B. japonica* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 131. 1867; 江苏南部种子植物手册 224, 图 347. 1959. — *B. platyphylla* var. *macrophylla* Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 213. 1869. — *B. spicata* var. *duploserrata* C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 488. 1899. — *B. taiwaniana* Nakai et Satake in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. II, 4: 526, f. 45—46. 1936; Li, Woody Fl. Taiwan 13. 1963; T. S. Liu et W. D. Huang in Li, Fl. Taiwan 2: 170. 1976.

亚灌木或多年生草本,高0.6—1.5米,上部通常有较密的开展或贴伏的糙毛。叶对生,同一对叶等大或稍不等大;叶片纸质,近圆形、圆卵形或卵形,长7—17(—26)厘米,宽5.5—13(—20)厘米,顶端骤尖,有时不明显三骤尖,基部宽楔形或截形,边缘