

米，顶端有2小齿，外面密被柔毛，果期近卵形，长约2.2毫米，有2—4条纵肋；柱头长约4毫米，瘦果狭卵球形，长2—2.2毫米，稍背腹扁，褐色，有光泽。花期6月。

产云南北部（大关、盐津）、四川西南部（布拖）。生于海拔800—1300米间山地灌丛中。模式标本采自云南大关。

### 7. 狭叶雾水葛

*Pouzolzia angustifolia* Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 6; t. 2100, fig. 39. 1853. —*P. indica* (L.) Gaud. var. *angustifolia* (Wight) Wedd. in DC. Prodr. 16 (1); 221. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5; 581. 1888; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26; 490. 1899.

多年生草本。茎高约60厘米，上部疏被短柔毛。叶互生；叶片草质，披针形或狭披针形，长2.8—9厘米，宽0.8—3厘米，顶端长渐尖，基部宽楔形或近圆形，边缘全缘，上面无毛，下面只沿脉疏被短糙伏毛，基出脉3条，侧脉1—2对；叶柄长0.1—1.5厘米；托叶三角形，长4—6毫米，顶端钻状渐尖。团伞花序腋生，直径2—6毫米，茎顶部的雌性，其下的两性；苞片狭卵形或披针形，长0.6—1毫米，边缘被短柔毛。雄花：花梗长1毫米左右；花被片4，椭圆形，长约1.2毫米，基部合生，外面上部疏被短柔毛，顶端角状突起长约0.2毫米；雄蕊4；退化雌蕊长约0.6毫米。雌花：花被椭圆形，长约1毫米，顶端具2小齿，被短柔毛，果期狭卵形，长约1.8毫米，疏被短柔毛，约有9条纵肋，沿肋常有狭翅；柱头长约2.2毫米。瘦果狭卵球形，长约1毫米，白色或带淡褐色，有光泽，光滑。花期5月。

产广东南部和广西南部。生于草地上。马来西亚和印度尼西亚也有分布。

### 8. 雾水葛（岭南采药录） 图版81：1—4

*Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. Pl. Jav. Rav. 67. 1838—52; Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 6; t. 2101, f. 45. 1853; 广州植物志403, 图209. 1956; 福建植物志1: 476. 1982; 云南种子植物名录, 上册, 736. 1984. —*Parietaria zeylanica* L. Sp. Pl. 1052. 1753; Fl. Zeyl. n. 371. 1753. —*Urtica alienata* L. Syst. Veg. ed. 13, 709. 1758; Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 2; t. 693. 1843. —*Pouzolzia indica* var. *alienata* (L.) Wedd. in DC. Prodr. 16 (1); 221. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5; 581. 1888; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26; 490. 1899.

#### 8a. 雾水葛（原变种）

##### var. *zeylanica*

多年生草本；茎直立或渐升，高12—40厘米，不分枝，通常在基部或下部有1—3对对生的长分枝，枝条不分枝或有少数极短的分枝，有短伏毛，或混有开展的疏柔毛。叶全部对生，或茎顶部的对生；叶片草质，卵形或宽卵形，长1.2—3.8厘米，宽0.8—2.6厘米，短分枝的叶很小，长约6毫米，顶端短渐尖或微钝，基部圆形，边缘全缘，两面有疏伏毛，或有时下面的毛较密，侧脉1对；叶柄长0.3—1.6厘米。团伞花序通常两性，



图版 81 1—4. 雾水葛 *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn.: 1. 植株, 2. 雄花, 3. 雌花, 4. 瘦果。5. 多枝雾水葛 *P. zeylanica* var. *microphylla* (Wedd.) W. T. Wang: 植株一部分。6—7. 银叶雾水葛 *P. argenteonitida* W. T. Wang: 6. 叶及腋生团伞花序, 7. 雄花。8—9. 美叶雾水葛 *P. calophylla* W. T. Wang et C. J. Chen: 8. 叶及腋生团伞花序, 9. 雄花。(刘春荣绘)