

4. 青皮木属——*Schoepfia* Schreb.

Schreb. Gen. 129. 1789; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 348. 1862;

Engl. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. 3(1): 233. 1894; Sleum.

in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. 16(b): 30. 1935, et in Blumea

26(1): 161. 1980; Schult. in Engl. Syll. Pflanzenfam. ed. 12, 2: 66.

1964. — *Schoepfiopsis* Miers, in Journ. Linn. Soc. Bot. 17: 75. 1878.

小乔木或灌木。叶互生，叶脉羽状。花排成腋生的蝎尾状或螺旋状的聚伞花序，稀花单生；花萼筒与子房贴生，结实时增大，顶端有(4—)5(—6)枚小萼齿或截平；副萼小，杯状，上端有2—3枚小裂齿，结实时不增大或无副萼而花基部有膨大的“基座”；花冠管状，冠檐具(4—)5(—6)裂片，雄蕊与花冠裂片同数，着生于花冠管上，且与花冠裂片对生；花丝极短，不明显，花药小，2室，纵裂；子房半下位，半埋在肉质隆起的花盘中，下部3室，上部1室，每室具胚珠1枚，白特立中央胎座顶端向下悬垂，柱头3浅裂。坚果，成熟时几全部被增大成壶状的花萼筒所包围，果实顶端常有环状的花萼裂齿和花冠着生处的残迹；成熟种子1枚，胚乳丰富。

模式种：秘鲁青皮木 *Schoepfia schreberi* Gmel.*.

约40种，分布热带、亚热带地区。我国3种、1变种，主产南方各省区，青皮木可分布到甘肃、陕西、河南三省的南部。

分 种 检 索 表

1. 花有短梗，排成总状花序状的蝎尾状聚伞花序，花序基部有1枚苞片；副萼小，杯状，先端3深裂；果近球形；叶革质或薄革质；常绿性(组1. 香美木组 Sect. *Alloschoepfia* Sleum.).....1. 香美木 *S. fragrans* Wall. ex Roxb.
1. 花无梗，排成穗状花序状的螺旋状聚伞花序或花2—3(—4)朵集生成近于头状花序式的螺旋状聚伞花序，有时花单生，花序基部无苞片；花无副萼；果椭圆形或长圆形或长卵形；叶纸质，稀为厚纸质，落叶性(组2 青皮木组 Sect. *Schoepfiopsis* (Miers) Engl. ex Engl. u. Prantl).
2. 叶卵形或长卵形或叶椭圆形或卵状椭圆形(叶椭圆形者，其果大，长1.6—2厘米)；花(2—)3—9朵排成螺旋状聚伞花序，花冠钟形，柱头常伸出花冠外。
3. 叶卵形或长卵形，纸质；果小，长1—1.2厘米，直径5—8毫米.....2a. 青皮木 *S. jasminodora* Sieb. et Zucc.
3. 叶椭圆形或卵状椭圆形，厚纸质；果大，长1.6—2厘米，直径13—15毫米.....2b. 麻栗坡青皮木 *S. jasminodora* var. *malipoensis* Y. R. Ling

* 属于 Sect. *Schoepfia* 组中，该组我国不产。

2. 叶长椭圆形、椭圆形或卵状披针形；花 2—3(—4) 朵集生成近似头状花序式的螺旋状聚伞花序，有时花单生，花冠管状，柱头通常不伸出或偶有略伸出花冠管外……………
…………… 3. 华南青皮木 *S. chinensis* Gardn. et Champ.

组1. 香芙木组——Sect. *Alloschoepfia* Sleum. in *Blumea* **26**(1): 162. 1980. —*Schoepfiopsis* Miers in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **17**: 75. 1878. p. p.; Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* **43**: 551. 1896. p. p. —*Schoepfia*, Sect. *Euschoepfia* Engl. in *Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam.* **3**(1): 146. 1897; Sleum. in *Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam.* **16b**: 31. 1935.

花具短梗，排成总状花序式的蝎尾状聚伞花序，花序基部有数枚覆瓦状排列的苞片；副萼由花基部的苞片与 2 枚小苞片合生而成，杯状、小，先端有 3 裂齿。

模式种：香芙木 *Schoepfia fragrans* Wall. ex Roxb.

1. 香芙木(中国高等植物图鉴) 图版 10: 1—2

Schoepfia fragrans Wall. in Roxb. *Fl. Ind.* **2**: 188. 1824; DC. *Prodr.* **4**: 320. 1830; Mast. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **1**: 581. 1875, excl. Griffith t. 629(coll. in Bhutan); Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* **3**(1): 146, f. 148. 1897; Schneid. in Sargent, *Pl. Wils.* **3**: 322. 1916; Sleum. in *Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam.* **16b**: 31, f. 18 A—C. 1935, et in *Blumea* **26**(1): 162. 1980; Merr. in *Journ. Arn. Arb.* **19**: 26. 1938; Gagnep. in Lecomte, *Fl. Gén. Indo-Chiné Suppl.* 740. 1948; Van Steen. in Reinwardtia **1**: 470, f. 1. 1952; Hara, *Fl. East. Himal.* **2**: 21. 1971; 中国高等植物图鉴 **1**: 529, 图 1058, 1972; Hara et Williams, *En. Fl. Pl. Nepal* **2**: 86. 1979; 林有润, *植物研究* **2**(4): 19. 1982. —*S. acuminata* Wall. ex DC. l. c. **4**: 320. 1830; Mast. in Hook. f. l. c. **1**: 582. 1875; Craib, *Fl. Siam. En.* **1**: 272. 1926; Gagnep. in Lecomte, l. c. *Suppl.* 739. f. 87, 1—4. 1948. —*S. griffithiana* Valet Crit. *Overz. Olacin.* 128. 1886. —*S. miersii* Pierre, *Fl. For. Cochinch. pl.* 265B. 1892; Gagnep. in Lecomte, l. c. **1**: 820, f. 93, 5—7. 1911, et *Suppl.* 740. 1948. —*Schoepfiopsis acuminata* (Wall. ex DC.) Miers, in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **17**: 77, pl. 2. 1878. —*S. fragrans* (Wall. ex DC.) Miers, l. c. **17**: 76. 1878.

常绿小乔木，高 2.5—10 米；树皮灰黄色；小枝干时黑褐色，老枝灰褐色。叶革质或薄革质，干后灰绿色，长椭圆形、长卵形、椭圆形或长圆形，长 6—9(—11) 厘米，宽 3.5—5 厘米，顶端渐尖或长渐尖，常偏斜，基部通常楔形，有时近圆形；侧脉每边 3—8 条，两面明显，网脉稍明显；叶柄长 4—7 毫米。花 5—10 朵或更多，排成总状花序式的蝎尾状聚伞花序，花序长 2—3.5 厘米，花梗长 2—6 毫米，总花梗长 1—1.5 厘米；花萼筒杯状，与子房贴生，上端具 (4—) 5 枚小萼齿；副萼小，杯状，结实时不增大，上端具 3 裂齿；花冠筒状或管状，