

Lingnan Sci. Journ. 5: 70. 1927; 海南植物志 2: 458, 图 522. 1965; 中国高等植物图鉴 1: 531, 图 1062. 1972; Hiepko in Willdenowia 9: 45, f. 18. 1—3. 1979.

攀援状灌木, 高 2—6 米; 枝条广展, 有时具刺, 小枝、花序均被淡黄色短绒毛。叶薄革质, 卵圆形或长圆状披针形, 长 4—10 厘米, 宽 2.5—5 厘米, 顶端长渐尖, 基部阔楔形或圆钝, 有时稍偏斜, 全缘; 侧脉 4—6 对, 两面微凸起; 叶柄长 2—4 毫米, 被短柔毛。花多朵排成密生的穗状花序, 花序 1—3 个聚生于叶腋, 长 1—2.5 厘米, 苞片细小, 花被管坛状, 黄色, 长约 3 毫米, 外面被短柔毛, 裂片 4 枚, 短, 卵状三角形; 雄蕊约与花被管等长; 腺体直立, 极短, 卵形, 急尖头; 子房圆筒状。核果长椭圆状或椭圆状, 长 1.2—1.8 厘米, 无毛, 顶端有小突尖, 成熟时橙红色, 内果皮脆壳质。花期 10 月至翌年 1 月, 果期 1—4 月。

产于云南、广西、广东等省区; 多见于低海拔山地疏林或灌木林中。印度、缅甸和亚洲东南部各国也有分布。模式标本采自印度。

本种具根寄生习性。

2. 山柚子属——*Opilia* Roxb.

Roxb. Pl. Corom. 2: 31, t. 158. 1802.

攀援灌木或小乔木。叶革质, 互生, 排成二列, 边全缘; 中脉明显凸起; 叶柄短。花两性, 排成腋生的总状花序或聚伞花序, 苞片早落, 花萼细小, 全缘, 环状, 或具不明显的 5 齿, 稀 4 或 6 齿; 花瓣 5 枚, 稀 4 或 6 枚, 离生, 长圆形, 顶端伸展外弯; 雄蕊 5 枚, 离生, 与花瓣对生, 花药 2 室, 纵裂; 腺体 5 枚, 肉质, 与花瓣互生; 子房上位, 椭圆状, 顶端较狭, 1 室, 胚珠 1 颗, 下垂, 花柱极短, 柱头小, 盘状, 中央下凹。核果, 中果皮肉质, 内果皮脆壳质。

模式种: 山柚子 *O. amentacea* Roxb.

约 22 种, 分布于非洲、亚洲的热带地区和澳大利亚东北部。我国有一种, 产于云南。

1. 山柚子 图版 12: 6—7

Opilia amentacea Roxb. Pl. Corom. 2: 31, t. 158. 1802, et Fl. Ind. 2: 87. 1824; Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 583. 1875; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chiné 1: 804. 1911; Back. et Bakh. f. Fl. Java 2: 66. 1965.

攀援状的灌木或柔弱的小乔木, 小枝被微柔毛。叶革质, 卵形或卵状披针形, 长 3—14 厘米, 宽 1—5.5 厘米, 无毛, 边全缘, 中脉明显凸起; 叶柄长 3—10 毫米。花序长 2—4 厘米, 直立, 密被淡红褐色短柔毛; 苞片阔卵形; 花梗长 1.7—2.7 毫米, 被微柔毛; 花萼小, 全缘; 花瓣 5 枚, 黄绿色, 长 1.7—2.2 毫米, 外面被短柔毛, 早落; 腺体椭圆状, 钝头, 长度仅为雄蕊的一半。核果卵球形、球形或椭圆状, 红色, 长 1—2.5 厘米, 基部具宿存的花萼和花