

盘。 花期4—6月,果期7—10月。

产于云南南部;生于中海拔山地密林中。亚洲南部、东南部各国也有分布。模式标本采自印度。

3. 尾球木属——*Urobotrya* Stapf

Stapf in Journ. Linn. Soc. **37**: 89. 1905; Hiepko in Ber. Deutsch.

Bot. Ges. **84**: 662, 1972, et in Willdenowia **9**: 29. 1979.

灌木或小乔木,小枝无毛或被微柔毛。叶互生,薄革质,无毛或仅中脉有毛,边全缘;叶柄短。花两性,排成总状花序,通常3朵花着生于每个苞片内,花序轴纤细,无毛或被微柔毛;苞片阔,绿色,边缘透明,具缘毛,密集覆瓦状,于开花前脱落,在花序基部的数枚较小的苞片宿存;花(3—)4(—5)数,单花被,花被片离生,镊合状排列,长圆形,顶急尖,内面无毛;雄蕊与花被片同数且对生,长于花被片;花盘环状,肉质;子房圆锥状至圆筒状,花柱缺,柱头不分裂或4浅裂。核果椭圆状,中果皮肉质,薄;胚小,具子叶3枚。

模式种: 刚果尾球木 *U. congolana* (Baill.) Hiepko.

6—7种,分布于非洲的热带地区和亚洲东南部。我国有一种,产于云南及广西。

1. 尾球木(新拟)

Urobotrya latisquama (Gagnep.) Hiepko in Ber. Deutsch. Bot. Ges. **84**: 662. 1972, et in Nat. Hist. Bull. Siam Soc. **27**: 122, f. 6(map). 1978, et in Willdenowia **9**: 29. 1979. — *Lepionurus latisquamus* Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chiné **1**: 807. f. 91. 1911; 陈焕镛、侯宽昭,植物分类学报 **7**: 62. 1958。

灌木或小乔木,高约4米,枝条淡绿色,干后黄褐色,无毛,具不明显的条纹。叶无毛,阔披针形至狭披针形,稀卵形或倒卵形,长(7—)11—18(—23)厘米,宽(3—)4—6(—7)厘米,顶端渐尖或急尖,基部楔形;侧脉7—10(—12)对,在两面均稍突起,边全缘;叶柄长1—3毫米,无毛。花序通常单个生于叶腋,亦生于枝条已落叶腋部或主干上,花序轴长7—11厘米,无毛;苞片阔卵形至圆形,顶端骤渐尖,长和宽均为6—7毫米,每个苞片内通常着生3朵花,无小苞片;花梗长3—5毫米;花被片4枚,黄绿色,长3毫米;雄蕊与花被片对生,花丝长4—5毫米,花药椭圆状,长约1毫米;花盘突起呈环状;子房高于花盘部分近圆锥状,长1—1.5毫米,1室。核果红色,长13—25毫米,直径7—15毫米;果梗长5—6毫米。 花期4—5月,果期7—8月。

产于云南(勐腊、金平、富宁),广西(龙州、扶绥);生于海拔1000米以下山谷密林或疏林中,喜生于石灰岩山上。缅甸南部、泰国、老挝、越南也有分布。模式标本采自老挝。