

内面常被微柔毛；雄蕊5枚；子房与花被大部连生，花柱短圆柱状，柱头多少呈长圆盾状。核果卵圆状长圆形，长6—8毫米，直径3.5毫米，有纵沟5—6条，基部圆形，顶端宿存花被裂片直立，内弯；种子1枚，圆柱状。花果期7—8月。

产于四川、湖北、贵州、广西。在海拔1000—1400米林中，常寄生于锈毛钝果寄生 *Taxillus levinei* (Merr.) H. S. Kiu 等桑寄生科植物的枝上。模式标本采自四川城口。

2. 粗序重寄生(新拟) 图版 17: 3—5

Phacellaria caulescens Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Lond. **28**: 122, t. 17. 1890; R. Pilg. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **16b**: 71. 1935; Danser in Blumea **3**(2): 221, pl. 9, 21—22; 1939.

花序粗壮，圆柱状，长20—30厘米，常扭旋，重(复)分枝，基部直径约2.5毫米，有细纵棱，不压扁，顶端初时多少被绒毛，后渐无毛。苞片颇大，略圆形，顶端短渐尖，长约1毫米，宽0.8毫米，扁平，覆瓦状排列；小苞片2枚或更多，微小。花单性，散生；雌花：花蕾呈球形，直径1.3毫米，后渐增大呈椭圆形至椭圆状长圆形，花被裂片细小，4—6枚，三角形，花盘颇扁平；花柱短。核果卵状长圆形，长5—6毫米，直径2毫米，黄色，宿存花被裂片内弯，下部稍缢缩，无果柄。花期5—8月，果期10—12月。


产于云南、广西。在海拔900—2400米杂木林中，寄生于鞘花 *Macrosolen cochinchinensis* (Lour.) Van Tiegh. 等桑寄生科植物上。缅甸也有分布。我国分布新记录。模式标本采自缅甸。

3. 扁序重寄生(新拟) 图版 17: 1—2

Phacellaria compressa Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **3**(1): 229. 1880; R. Pilg. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **16b**: 71. 1935. — *Phacellaria wattii* Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 235. 1886. — *Phacellaria ferruginea* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**: 188. 1918.

花序疏生(不密集)，不分枝或很少分枝，通常长达20厘米，扁平或大部压扁，直径1—4毫米，被铁锈色绒毛，后渐脱落仅花簇四周有残存的绒毛；苞片覆瓦状排列，卵形或倒卵形，顶端渐尖，长约0.8毫米，宽0.5毫米；小苞片小，多数，集成总苞。花单性，通常雌雄异株，苞腋内成簇着生，有时单生于短分枝上，有时陷入于花序轴的洼穴中；雄花扁球形，长1毫米直径1.5毫米，花被深裂至基部，裂片5—8，直立或稍开展，短三角形，长和宽约1毫米，花丝短而扁；雌花倒卵形，长2毫米，直径1.5毫米，花被裂片5枚，三角形，长约0.5毫米；花盘近平坦，花柱很短，柱头截形。核果卵状长圆形，长达6毫米，直径3—4毫米，无毛，顶端具宿存花被，基部稍宽。花期5月，果期10月。

产于西藏、四川、云南、广西。在海拔550—1800米杂木林中，常寄生于广寄生 *Taxillus chinensis* 等桑寄生科植物，偶寄生于寄生藤属 (*Dendrotrophe*) 植物上。缅甸、泰国、越南也有分布。模式标本采自缅甸。



1-2. 扁序重寄生 *Phacellaria compressa* Benth.: 1. 花序(生长于寄主枝条上); 2. 一段果序。3-5. 粗序重寄生 *Ph. caulescens* Collett et Hemsl.: 3. 果序; 4. 一段果序; 5. 果。6-7. 重寄生 *Ph. fargesii* Lecomte: 6. 果序; 7. 一段果序。(黄少容绘)