

4. 硬序重寄生(新拟)

Phacellaria rigidula Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3(1): 229. 1880; R. Pilg. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 16b: 71. 1935; Danser in Blumea 3(2): 219, pl. 2, 9, 13—20. 1939.

花序簇生,细长,圆柱状,坚硬,长10—25厘米,直径约1.5毫米,不分枝或很少分枝,幼嫩时薄被绒毛,成熟时除花的四周外渐无毛;苞片卵形呈椭圆形,长约1毫米,宽约0.6毫米,顶端尖锐,覆瓦状排列;小苞片位于花簇周围,通常3—6枚集成总苞。花单性,雌雄同株,散生,生于苞片或小苞片腋内,后渐形成花簇;雄花近球形,直径1.6毫米,花被裂片4—5枚,三角形;雌花倒卵形,直径1.5—1.7毫米,花被裂片比雄花的同大或稍大;花盘略呈圆锥状;柱头常多少外伸。果长圆形,有5棱,长4毫米,直径1.5毫米,基部较上部宽阔,宿存花柱稍外伸。花期5月,果期9月。

产于四川、云南、广西、广东。在海拔1400—2100米杂木林中,常寄生于桑寄生科如 *Taxillus thibetensis*, *T. limprichtii* 和槲寄生属 *Viscum* 等植物上。缅甸也有分布。模式标本采自缅甸。

5. 长序重寄生(新拟)

Phacellaria tonkinensis Lecomte in Bull. Mus. Nat. Hist. Paris, 20(7): 399. 1914; R. Pilg. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 16b: 71. 1935; Danser in Blumea 3(2): 224, pl. 4, 1; Pl. 8, 9—12. 1939.

花序簇生,柔韧而细长,圆柱状,长10—30厘米,直径1—1.5毫米,无毛,不分枝或很少分枝。苞片小,半圆形至近圆形,有时顶端短尖,长约0.5毫米,初时呈覆瓦状排列,小苞片不明显或消失;无总苞。花单性或两性,雌雄异株或同株,第一朵花腋生,其他的花在其四周簇生;雄花:花被管带白色,花被裂片5,三角形,与花盘离生;雄蕊5,花丝很短,花药小;花盘近平坦,浅裂;雌花和两性花:椭圆形,花被裂片通常5枚,偶有6枚,三角形,长1.5—2毫米,镊合状排列,花柱短圆柱形,柱头截形或稍呈长圆盾状。核果卵圆状长圆形,长8—9毫米,直径2.5—3毫米,基部附近最宽阔,向上渐狭,内果皮脆骨质,有纵沟5—6条;种子椭圆形。花期6—8月,果期10月至翌年2月。

产于广东(海南)。在海拔1000米山地林中。越南也有分布。我国分布新记录。模式标本采自越南。

本种常寄生于广寄生 *Taxillus chinensis*、双花鞘花 *Macrosolen bibracteolatus* 和离瓣寄生 *Helixanthera parasitica* 等植物上。

6. 寄生藤属——*Dendrotrophe* Miq.

Miq. Fl. Ned. Ind. 1: 779. 1855. — *Henslowia* Bl. in Mus. Bot.