

米。花单性,雌雄异株;雄花: 6朵簇生,总花梗长0.5—1毫米;花被裂片5,三角形,长0.8毫米;雄蕊5枚,有短花丝;雌花: 黄色,单生或2—5朵聚生;总花梗长1—1.5毫米;小苞片数枚,卵形,长2毫米,宽1毫米,顶端锐尖;花被管圆锥状,长1.8毫米,花被裂片5,与雄花的相似;花盘五角形;花柱缺,柱头头状。核果卵圆形,长4毫米,具不明显的稜,黄色。花期12月至翌年3月,果期5—7月。

产于云南。生于海拔1400—2000米山地松栎混交林中。越南也有分布。模式标本采自云南龙陵。

4. 伞花寄生藤(新拟)

Dendrotrophe umbellata (Bl.) Miq. Fl. Ned. Ind. 1:779. 1855. — *Viscum umbellatum* Bl. Bijdr. 666. 1826. — *Henslowia umbellata* (Bl.) Bl. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1:243. 1850.; Lecomte Fl. Gén. Indo-chine 5: 218. f. 23. 1915. — *Thesium sputulatum* Bl. Bijdr. 646. 1850.

4a. 伞花寄生藤(原变种) 图版 18: 5—6

Dendrotrophe umbellata (Bl.) Miq. var. **umbellata**

木质藤本;小枝近四棱形,后变圆柱状,淡褐色。叶薄革质,倒卵圆形至近匙形,长4—7(—8)厘米,宽2—4厘米,顶端圆或钝,基部阔楔形,下延而成叶柄,上面有光泽,基出脉3条,在两面不明显;叶柄长4—6毫米。花单性,雌雄异株,直径约1毫米;雄花: 3—5朵集成伞形花序;总花梗长5—7毫米;花梗长2.5—3毫米;小苞片连生呈总苞状;花被管圆柱形,顶端5裂,裂片三角形,长2/3毫米,在雄蕊后面有舌状物一条,顶端内弯;雄蕊5枚,花丝长约0.3毫米;花药室圆形;雌花: 单生或2—3朵聚生,花梗长1.5—2毫米;花被管卵圆形,花被裂片5,三角形;花盘肉质;花柱长3/4毫米,柱头盾状,近圆形,不明显5裂。核果倒卵状,长10毫米,有柄,成熟时深红色至黑色。花期2—4月,果期5—6月。

产于广东(海南)。生长于疏林下。老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚也有分布。我国分布新记录。模式标本采自马来西亚。

4b. 长叶寄生藤(变种)

Dendrotrophe umbellata (Bl.) Miq. var. **longifolia** (Lecomte) Tam, comb. nov. — *Henslowia umbellata* (Bl.) Bl. var. *longifolia* Lecomte, Fl. Gén. Indo-chine 5: 219. 1915.

本变种的叶披针状长圆形,长8—11厘米,宽3—4厘米;叶柄长6—10毫米。

产于云南(南部)。生于海拔1100米林中。柬埔寨亦有分布。我国分布新记录。模式标本采自柬埔寨。

5. 黄杨叶寄生藤(新拟)

Dendrotrophe buxifolia (Bl.) Miq. Fl. Ned. Ind. 1: 781. 1855. — *Henslowia*