

被黄色绒毛;苞片狭披针形,长约2毫米,宽0.7毫米,外被长柔毛,早落;花长约3.8毫米,直径5.5毫米,淡黄色至红黄色,花被裂片5,卵圆形,长约2毫米,宽约1.5毫米,顶端近锐尖,外被短柔毛,近基部被毛较密,在雄蕊后面有疏毛一撮;雄蕊5枚,花丝短,长约1.5毫米;花盘中部凹陷,直径约1.8毫米;花柱长0.8—1毫米,柱头3—4浅裂,中部凹入。核果长3—3.5厘米,直径2.3—2.5厘米,无毛,成熟时橙黄色或橙红色,有光泽,顶端的宿存花被呈乳突状,直径2—2.5毫米,基部渐狭而伸长,上部较粗,下部较细(长1—1.5厘米,粗3—5毫米),呈果柄状。花期4—5月,果期8—9月。

产于云南、广西、广东(海南)。生于海拔800—1200米潮湿山区的缓坡或山谷疏林中,常与龙脑香属 *Dipterocarpus* 等植物组成混交林。斯里兰卡、印度、缅甸、老挝、柬埔寨、越南和马来西亚也有分布。模式标本采自印度。

本种的种子含油量为67.45%,提取的油可作润滑油和制皂等工业原料;植株的幼嫩部分和成熟的果实可少量食用。

1b. 无刺硬核(变种)(新拟)野葫芦(云南)。

Scleropyrum wallichianum (Wight et Arn.) Arn. var. *mekongense* (Gagnep.) Lecomte in Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 20(7):404. 1914, et Fl. Gén. Indo-Chine 5:221. 1915. — *Scleropyrum mekongense* Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 2:196. 1912.

本变种的茎或枝无刺;叶被疏毛,基部楔形,雄花被外面具绒毛。

产于云南(南部)。生于海拔600—1650米密林中。柬埔寨、老挝、越南也有分布。模式标本采自老挝。

2. 百蕊草族——Trib. Thesiceae

Reichb. Handb. 167. 1837.

草本植物。子房下位,花被管基部与子房连生,通常在子房以上延伸,花被裂片宿存,花盘缺;胚珠2—3枚,位于特立中央胎座顶端;果为(小)坚果。

我国产1属。

8. 百蕊草属——*Thesium* L.

L. Sp. Pl. 207. 1753; A. DC. Prodr. 14:637. 1857; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3:221. 1880; R. Pilg. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 16b: 85. 1935. — *Rhinostegia* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 14:56. 1843.