

月,果期 5—8 月。

产于西藏(墨脱)、云南、贵州、广西、广东、福建。海拔 20—1500(—1800) 米沿海平原或山地常绿阔叶林中,寄生于锥属、柯属、樟属、榕属植物及荷树、油桐、苦楝等多种植物上。印度东北部、锡金、缅甸、马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚、菲律宾等国也有分布。模式标本采自越南。

茎、叶入药,有祛风湿等效。

据观察本种开红色或淡红色花与淡黄色花的植株,其花的形态特征一致。

2. 密花离瓣寄生(新拟)

Helixanthera pierreii Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **16**: 25. 1938.; 丘华兴,广西植物 **6**: 42, f. 1, 1986.——*Loranthus longispicatus* Lecomte var. *grandifolius* Lecomte, Not. Syst. **3**: 78. 1914, et in Fl. Gén. Indo-Chine **5**: 199. 1915.——*Helixanthera longispicata* auct. non (Lecomte) Danser: 云南植物志 **3**: 355, pl. 103, 4—5. 1983.

灌木,高约 1 米,枝和叶均无毛;小枝粗壮,初具钝棱,后变圆柱形,暗黑色,近平滑,具散生皮孔。叶厚革质,通常 3 枚聚集呈近轮生或互生,披针形或长圆状披针形,长 8—15 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端短渐尖,通常钝头,基部楔形或圆钝,稍下延,上面具光泽;中脉在下面凸起,侧脉两面均不明显;叶柄长 1—2 厘米。穗状花序,通常 3 个簇生于小枝顶端,长 15—19 厘米,具花 40 朵以上,初密集,后散生,花序轴粗壮,浅红色,粗 2.5—3.5 毫米,干后具浅纵沟,在花着生处稍凹入,仅基部 1—2 厘米一段无花;苞片杯状,长约 1.5 毫米,背部凸起呈囊状,被微毛及短缘毛;花红色,被浅灰色微鳞片状毛,花托卵球形,长约 2 毫米;副萼环状,长约 1 毫米,近全缘;花冠花蕾时椭圆形,中部稍窄,花瓣 5 枚,披针形,长 5—6 毫米,宽约 1 毫米,上半部反折;雄蕊着生于花瓣下半部,花丝扁平,长 1—1.5 毫米,花药长 1—1.5 毫米,2 室,药隔稍突出,急尖;花盘环状,稍呈 5 角;花柱柱状,长 3—4 毫米,具五棱,柱头几不增大,顶端钝。幼果卵球形,长 4.5 毫米,直径 3.5 毫米,被微毛,干后果皮具浅纵皱纹。花期 4—5 月。

产于云南(景洪、勐腊)。海拔 800—1500 米山地阔叶林中,寄生于杜鹃属等植物上。柬埔寨也有分布。模式标本采自柬埔寨(暹邦)。

本种近似产于马来西亚的无梗离瓣寄生 *Helixanthera apodanthes* Danser, 但后者的花稍小,花瓣长 3.5—4 毫米,花药顶端钝。

3. 景洪离瓣寄生(广西植物) 景洪寄生

Helixanthera coccinea (Jack) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, **10**: 317. 1929, op. cit. **11**: 374, f. 18 a—c. 1931 op. cit. **16**: 22. 1938; 云南植物志 **3**: 357, pl. 103, 3. 1983; 丘华兴,广西植物 **4**: 124. 1984.——*Loranthus coccineus* Jack in Malay Miscell. **1**: 8. 1820; Ridl. Fl. Mal. Pen. **3**: 152. 1924; Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **5**: 188. 1915.