

10:319.1929; 丘华兴,植物分类学报 21: 174,图 2.1983.——*Loranthus terrestris* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 207. 1886.

灌木,高 0.5—2 米,幼枝、叶和花序均密被褐色鳞秕,不久鳞秕全脱落;小枝灰色,密生小皮孔。叶纸质,对生或互生,披针形、长卵形或椭圆形,长 5—8 厘米,宽 2—3.5 厘米,顶端渐尖或钝渐尖,基部楔形,稍下延;侧脉 3—4 对,两面略明显;叶柄长 3—6 毫米。总状花序,1—2 个腋生,有时生于短枝的顶部,具花 2—3(—4) 朵,花序梗长 6—10 毫米,花梗长 0.5—1 毫米;苞片卵圆形,长 1—1.5 毫米,被鳞秕;花粉红色,花托坛状,长 1.5—2 毫米,密被灰色鳞秕,花后渐脱落;副萼环状,长约 0.5 毫米,全缘;花冠无毛,花蕾时柱状,近基部稍膨胀,具 4 钝棱,花瓣 4 枚,披针形,长 7—8 毫米,中部两侧具长约一毫米内折的膜质边缘,上半部反折;花丝长约 2 毫米,花药长 2 毫米,2 室;花盘垫状;花柱长约 7 毫米,四棱,柱头头状。果卵球形,橙黄色,长 7—8 毫米,直径约 4 毫米,基部钝圆,果皮平滑。花期 5—11 月,果期 6—8 月。

产于西藏(墨脱)。海拔 850—1800 米山地常绿阔叶林下或灌丛中,有时寄生于榕属植物等枝上。印度也有。模式标本采自印度东部卡西山。

西藏标本的幼枝和嫩枝仅具鳞秕,不久鳞秕脱落,符合本种原始记载:植物体无毛,具根寄生习性。

本种近似女贞叶寄生 *Helixanthera ligustrina* (Wall.) Danscr, 区别在于后者的幼嫩枝叶被锈色绒毛。

6. 广西离瓣寄生(植物分类学报) 小叶山鸡茶(海南岛),油茶寄生(广西)

Helixanthera guangxiensis H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. 21:174.1983.

灌木,高约 0.7 米,幼枝和叶密被黄色短星状毛,不久毛全脱落;小枝灰色,具皮孔。叶薄革质,互生或近对生,卵圆形或倒卵形,长 2—3 厘米,宽 1—2 厘米,顶端圆钝,基部阔楔形,稍下延;侧脉 2 对,在上面稍明显;叶柄长 2—4 毫米。总状花序,1—3 个腋生,具花 2—4 朵,花密集,花序和花均被黄色短星状毛,花序梗长约 1 毫米,花梗长约 3 毫米;苞片三角形,长约 1 毫米;花淡黄色,花托椭圆状,长 1.5 毫米;副萼环状,全缘或具 4 小齿;花冠花蕾时棒状,花瓣 4 枚,匙形,长 3—3.5 毫米,上半部反折;花丝长 1.5 毫米,花药长约 0.5 毫米,2 室,药隔阔;花柱长约 3 毫米,稍四棱,柱头扁球形。果椭圆状,淡黄色或橙色,长 7 毫米,直径 3—4 毫米,果皮平滑。花期 8—11 月,果期 11—12 月。

产于广西东南部、广东海南岛。海拔 300—1000 米山地常绿阔叶林中,寄生于油茶等植物上。模式标本采自广西陆川。

7. 滇西离瓣寄生(广西植物) 四瓣寄生

Helixanthera scoriarum (W. W. Smith) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser.3, 10: 318. 1929, et in Blumea 2:44.1936; 云南植物志 3:357.1983; 丘华兴,广西植物 4: 124.1984.——*Loranthus scoriarum* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 10: