

10:319.1929; 丘华兴,植物分类学报 21: 174,图 2.1983.——*Loranthus terrestris* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 207. 1886.

灌木,高 0.5—2 米,幼枝、叶和花序均密被褐色鳞秕,不久鳞秕全脱落;小枝灰色,密生小皮孔。叶纸质,对生或互生,披针形、长卵形或椭圆形,长 5—8 厘米,宽 2—3.5 厘米,顶端渐尖或钝渐尖,基部楔形,稍下延;侧脉 3—4 对,两面略明显;叶柄长 3—6 毫米。总状花序,1—2 个腋生,有时生于短枝的顶部,具花 2—3(—4) 朵,花序梗长 6—10 毫米,花梗长 0.5—1 毫米;苞片卵圆形,长 1—1.5 毫米,被鳞秕;花粉红色,花托坛状,长 1.5—2 毫米,密被灰色鳞秕,花后渐脱落;副萼环状,长约 0.5 毫米,全缘;花冠无毛,花蕾时柱状,近基部稍膨胀,具 4 钝棱,花瓣 4 枚,披针形,长 7—8 毫米,中部两侧具长约一毫米内折的膜质边缘,上半部反折;花丝长约 2 毫米,花药长 2 毫米,2 室;花盘垫状;花柱长约 7 毫米,四棱,柱头头状。果卵球形,橙黄色,长 7—8 毫米,直径约 4 毫米,基部钝圆,果皮平滑。花期 5—11 月,果期 6—8 月。

产于西藏(墨脱)。海拔 850—1800 米山地常绿阔叶林下或灌丛中,有时寄生于榕属植物等枝上。印度也有。模式标本采自印度东部卡西山。

西藏标本的幼枝和嫩枝仅具鳞秕,不久鳞秕脱落,符合本种原始记载:植物体无毛,具根寄生习性。

本种近似女贞叶寄生 *Helixanthera ligustrina* (Wall.) Danscr, 区别在于后者的幼嫩枝叶被锈色绒毛。

6. 广西离瓣寄生(植物分类学报) 小叶山鸡茶(海南岛),油茶寄生(广西)

Helixanthera guangxiensis H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. 21:174.1983.

灌木,高约 0.7 米,幼枝和叶密被黄色短星状毛,不久毛全脱落;小枝灰色,具皮孔。叶薄革质,互生或近对生,卵圆形或倒卵形,长 2—3 厘米,宽 1—2 厘米,顶端圆钝,基部阔楔形,稍下延;侧脉 2 对,在上面稍明显;叶柄长 2—4 毫米。总状花序,1—3 个腋生,具花 2—4 朵,花密集,花序和花均被黄色短星状毛,花序梗长约 1 毫米,花梗长约 3 毫米;苞片三角形,长约 1 毫米;花淡黄色,花托椭圆状,长 1.5 毫米;副萼环状,全缘或具 4 小齿;花冠花蕾时棒状,花瓣 4 枚,匙形,长 3—3.5 毫米,上半部反折;花丝长 1.5 毫米,花药长约 0.5 毫米,2 室,药隔阔;花柱长约 3 毫米,稍四棱,柱头扁球形。果椭圆状,淡黄色或橙色,长 7 毫米,直径 3—4 毫米,果皮平滑。花期 8—11 月,果期 11—12 月。

产于广西东南部、广东海南岛。海拔 300—1000 米山地常绿阔叶林中,寄生于油茶等植物上。模式标本采自广西陆川。

7. 滇西离瓣寄生(广西植物) 四瓣寄生

Helixanthera scoriarum (W. W. Smith) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser.3, 10: 318. 1929, et in Blumea 2:44.1936; 云南植物志 3:357.1983; 丘华兴,广西植物 4: 124.1984.——*Loranthus scoriarum* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 10:

184.1918.

灌木,高1—2米,幼枝和叶被锈色鳞秕,不久鳞秕全脱落;小枝暗褐色,具散生皮孔。叶纸质,对生或近对生,披针形至长卵形,长5—10(—12)厘米,宽1.5—4(—6)厘米,顶端渐尖,基部楔形或阔楔形,稍下延;侧脉两面均明显;叶柄长0.7—1.5厘米。穗状花序,1—2个腋生,长3—3.5厘米,具花10—16朵,花对生,被锈色鳞秕;苞片卵形,长约2毫米,被鳞秕;花橙色,花托卵球形,长约1.5毫米;副萼环状,具4浅齿;花冠花蕾时柱状,近基部稍膨胀,具4棱,花瓣4枚,披针形,长1—1.2厘米,上半部反折;花丝长3.5毫米,花药长2.5毫米,4室;花柱长1—1.2厘米,四棱,柱头头状。果椭圆状,黄绿色,长7—8毫米,直径5毫米,果皮平滑。花果期5—12月。

产于云南(盈江、腾冲、临沧)。海拔1650—2100米山地阔叶林中。模式标本采自腾冲。

本种原始记载:嫩枝和花均被锈色短柔毛;但根据同模式标本(Isotypus)及原产地标本,其幼枝、嫩叶和花仅具锈色鳞秕。

根据野外纪录,本种寄生于壳斗科柯属植物上,有的生长于坡地疏林或阔叶林中小灌木。

4. 桑寄生属——*Loranthus* Jacq.(1762), nom. conserv.

=*Loranthus* L. (1753).

Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 55:230, t.3.1762.——*Loranthus* L.Sect.

Microloranthus Engl. in Engl.u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 1:

128. 1897; Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam.

ed. 2, 16 b: 151. 1935.——*Hyphear* Danser in Bull. Jard. Bot. Bui-

tenzorg ser. 3, 10: 319.1929, op. cit. 16:26.1938.

寄生性灌木,嫩枝、叶均无毛。叶对生或近对生,侧脉羽状。穗状花序,腋生或顶生,花序轴在花着生处通常稍下陷;花两性或单性(雌雄异株),5—6数,辐射对称,每朵花具苞片1枚;花托通常卵球形;副萼环状;花冠长不及1厘米,花蕾时棒状或倒卵球形,直立,花瓣离生;雄蕊着生于花瓣上,花丝短,花药近球形或近双球形,4室,稀2室,纵裂;子房1室,基生胎座,花柱柱状,柱头头状或钝。浆果卵球形或近球形,顶端具宿存副萼,外果皮平滑,中果皮具粘胶质;种子1颗,胚乳丰富。

模式种:欧亚桑寄生 *Loranthus europaeus* Jacq.

约10种,分布于欧洲和亚洲的温带和亚热带地区。我国产6种,温暖地区和亚热带各省区均有。

本志的桑寄生属,采纳狭义的概念,即 *Loranthus* Jacq. 相当于 Engler 概念的 Lo-