

产于四川北部和东北部、甘肃、陕西、山西、内蒙古(准格尔旗)、河北、山东。海拔 950—2000(—2600) 米山地阔叶林中, 寄生于栎属、榆属、李属、桦属等植物上。日本本州、朝鲜中部也有分布。模式标本采自日本。

枝、叶民间作桑寄生入药。

本种近似欧亚桑寄生 *Loranthus europaeus* Jacq., 后者的花单性, 雌雄异株; 产于欧洲东南部至亚洲中亚细亚各国。

2. 南桑寄生(新拟) 贵州桑寄生(植物分类学报) 图版 23:8—11

Loranthus guizhouensis H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. 21: 171, f. 1. 1983.

落叶灌木, 高 0.5—1 米, 全株无毛; 茎常呈二歧地分枝, 小枝暗黑色, 被蜡被。叶对生, 纸质或薄革质, 卵形或椭圆形, 长 3.5—5 厘米, 宽 2—2.5 厘米, 顶端圆钝或急尖, 基部楔形, 稍下延; 侧脉 3—5 对, 两面均明显; 叶柄长 2—3 毫米。穗状花序, 顶生, 长 2.5—4 厘米, 具花 8—16 朵, 花两性, 对生或近对生, 淡青色; 苞片杓状, 长约 1 毫米; 花托卵球形, 长 1 毫米; 副萼环状; 花冠花蕾时长倒卵球形, 花瓣 6 枚, 披针形, 长 3—4 毫米, 开展; 雄蕊着生于花瓣中部, 花丝长约 0.5 毫米, 花药长约 1 毫米, 4 室(2 大、2 小); 花柱柱状, 长 2.5 毫米, 稍呈六棱, 柱头近截平。果卵球状, 长 4—5 毫米, 直径 2.5—3 毫米, 淡青色, 果皮平滑。花期 5 月, 果期 7—8 月。

产于云南东部、贵州、广西(凌云)、广东(封开、连县)、湖南(宁远)。海拔 200—1400 米山地常绿阔叶林中, 常寄生于小叶青冈等栎属植物上。模式标本采自贵州平坝。

3. 吉隆桑寄生(植物分类学报)

Loranthus lambertianus Schult. Syst. Veg. 7: 118. 1829; DC. Prodr. 4: 317. 1830; 丘华兴, 植物分类学报 21: 171. 1983. —*Hyphear lambertianum* (Schult.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 319. 1929.

落叶灌木, 高约 0.5 米, 全株无毛; 茎常呈二歧地分枝, 暗褐色, 近平滑, 具星散小皮孔, 一年生小枝绿色。叶对生, 纸质, 长卵形或长圆形, 长 5.5—6(—7) 厘米, 宽约 3 厘米, 顶端急尖或圆钝, 基部阔楔形, 稍下延; 侧脉 4—5 对, 两面均明显; 叶柄长 4—5(—10) 毫米。穗状花序, 顶生, 长 2.5—3.5 厘米, 具花 10—14 朵; 花两性, 近对生, 淡黄色; 苞片杓状, 长约 0.5 毫米; 花托椭圆状, 长 1.5—2 毫米; 副萼环状, 长不及 0.5 毫米; 花瓣 5 枚, 披针形, 长 3 毫米, 开展; 花丝短, 花药 4 室; 花盘环状; 花柱柱状, 长 2 毫米, 柱头钝头状。果卵球形, 长约 6 毫米, 直径约 5 毫米, 果皮平滑。花期 4—6 月。

产于西藏(吉隆、定结、墨脱)。海拔(1600—)2750—2800 米河谷阔叶林中, 常寄生于栎属植物上。尼泊尔也有分布。模式标本采自尼泊尔。

4. 华中桑寄生(新拟)

Loranthus pseudo-odoratus Lingelsh. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 357. 1922. —*Hyphear pseudo-odoratum* (Lingelsh.) Danser in Verh. Kon. Akad. Wetensch.