

Amsterd. afd. Natuurk Sect. 2, **29**(6): 61. 1933.——*Loranthus odoratus* auct. non Wall.: Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:406.1894.

灌木,高约0.5米,全株无毛;老枝暗黑色,粗糙,小枝通常具白色蜡被,具疏生皮孔。叶对生或近对生,纸质,卵形或长椭圆形,长4—10厘米,宽2—5.5厘米,顶端钝或圆钝,基部阔楔形,稍下延;侧脉3—5对,两面均明显;叶柄长5—7毫米。穗状花序,1—3个腋生,长1—2厘米,具花4—6(—10)朵;花两性,对生或近对生,淡青色;苞片杓状,长0.5毫米;花托卵球形,长约1毫米;副萼环状;花冠花蕾时倒卵球形,花瓣6枚,披针形,长约2.5毫米,稍开展,顶端内弯;花丝着生于花瓣下部,长约0.5毫米,花药长约0.5毫米,4室(2大、2小);花柱柱状,长2毫米,具六棱,顶端钝或偏斜,柱头稍增粗。果近球形,直径4毫米,淡黄色,果皮平滑。花期2—3月,果期7月。

产于四川(奉节)、湖北、浙江(龙泉、庆元)。海拔1600—1900米山地阔叶林中,寄生于栎属和锥属植物上。模式标本采自湖北宜昌。

本种近似槲树桑寄生 *Loranthus delavayi* Van Tiegh., 但本种的花两性,花蕾倒卵球形,花药4室,2大,2小(内侧)。本种与香味桑寄生 *Loranthus odoratus* Wall. 亦近似,但后者的果椭圆状,分布于尼泊尔、锡金、印度东部。

5. 台中桑寄生(植物分类学报) 高氏杞寄生(台湾植物志)

Loranthus kaoi (J. M. Chao) H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**: 171. 1983.——*Hyphear kaoi* J. M. Chao in Taiwania **18**:169, f.1.1973, et in Fl. Taiwan **2**: 244, pl. 283. 1976.

灌木,高约0.3米,全株无毛;小枝具皮孔。叶对生,革质,卵形至长圆形,长3—4厘米,宽1—2厘米,顶端钝或圆钝,基部楔形或近圆形;叶柄长6—7毫米。穗状花序,3—5个腋生,长2—3厘米,具花12—20朵,花序轴在花着生处稍下陷;花两性,对生,苞片阔三角形,长不及0.5毫米;花托近球形,长约1毫米;副萼环状,近全缘,具疏缘毛;花冠花蕾时棒状,花瓣6枚,披针形,长约2.5毫米;花丝着生于花瓣下部,长约1毫米,花药长0.5毫米,2室,药隔阔;花柱柱状,长约2.5毫米,柱头圆锥状。果长椭圆状,长5毫米,直径3毫米,果皮平滑。花期5—6月,果期8—10月。

产于台湾。中海拔山地阔叶林中,寄生于梨果寄生属植物枝条上。模式标本采自台湾。

未见标本,根据文献描述。

6. 槲树桑寄生(中国高等植物图鉴) 槲寄生(云南植物志) 图版 24:1—9

Loranthus delavayi Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France **41**: 535. 1894, cum var. *latifolio*; Lecomte, Not. Syst. **3**:168.1915, et in Sargent, Pl. Wils. **3**: 316. 1916, cum var. *latifolio*; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **7**: 303. 1929; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 219, 图 8473, 1982; 云南植物志 **3**: 353, pl. 102:1983.——*L. owatarii* Matsum. et Hayata in Journ.