

柱线状,约与花冠等长,具五棱,柱头头状。浆果通常卵球形,外果皮革质,中果皮具粘胶质;种子1颗。

模式种:五蕊寄生 *Dendrophthoe pentandra* (L.) Miq.

约30种,分布于非洲、亚洲和大洋洲的热带地区。我国产1种,分布于云南、广西、广东、东南亚热带地区。

1. 五蕊寄生(中国高等植物图鉴) 乌榄寄生(广东、广西) 图版 25:1—5

Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Fl. Ind. Bat. 1:818. 1856; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 11: 417. 1931, op. cit. 16:29. 1938; 中国高等植物图鉴补编 1:219. 1982; 云南植物志 3: 359, pl. 104, 1—3. 1983. — *Loranthus pentandrus* L. Mant. 1:63. 1767; Merr. in Philip. Journ. Sci. 15:232. 1919.

灌木,高达2米;芽密被灰色短星状毛,成长枝和叶均无毛;小枝灰色,具散生皮孔。叶革质,互生或在短枝上近对生,叶形多样,自披针形至近圆形,通常为椭圆形,长5—13厘米,宽2.5—8.5厘米,顶端急尖或圆钝,基部楔形或圆钝,稍下延;侧脉2—4对,两面均明显;叶柄长0.5—2厘米。总状花序,1—3个腋生或簇生于小枝已落叶腋部,具花3—10朵,初密被灰色或白色星状毛,后渐稀疏,花序轴长0.7—2厘米;花梗长约2毫米;苞片阔三角形,长1—1.5毫米;花初呈青白色,后变红黄色,花托卵球形或坛状,长2—2.5毫米;副萼环状或杯状,长0.5—1.5毫米,具不规则5钝齿;花冠长1.5—2厘米,下半部稍膨胀,5深裂,裂片披针形,长约1.2厘米,反折;花丝长3—4毫米,花药长3—5毫米;花盘环状;花柱线状,柱头头状。果卵球形,长8—10毫米,直径5—6毫米,顶部较狭,红色,果皮被疏毛或平滑。花果期12月至翌年6月。


产于云南、广西、广东。海拔20—700(—1600)米平原或山地常绿阔叶林中,寄生于乌榄、白榄、木油桐、杧果、黄皮、木棉、榕树等多种植物上。分布于孟加拉、马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚、菲律宾。模式标本采自孟加拉。

6. 梨果寄生属——*Scurrula* L.

L. Sp. Pl. 110. 1753, et Gen. Pl. 5: 48. 1754; Danser in Verhand.

Kon. Akad. Wetesch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, 29(6): 101. 1933.

寄生性灌木;嫩枝、叶被毛。叶对生或近对生,侧脉羽状。总状花序,稀少花的伞形花序,腋生;花4数,两侧对称,每朵花具苞片1枚;花托梨形或陀螺状,基部渐狭;副萼环状,全缘或具4齿;花冠在成长的花蕾时管状,稍弯,下半部多少膨胀,顶部椭圆状或卵球形,开花时顶部分裂,下面一裂缺较深,裂片4枚,反折;雄蕊着生于裂片的基部,花丝短,花药4室,药室具横隔或无;子房1室,基生胎座,花柱线状,约与花冠等长,具四棱,柱头通常头状。浆果陀螺状、棒状或梨形,下半部骤狭呈柄状或近基部渐狭,被毛或无毛,外果皮革



1—5. 五蕊寄生 *Dendrophthoe pentandra* (L.) Miq.: 1. 花枝; 2. 花蕾; 3. 花; 4. 苞片(腹面); 5. 果。(余汉平绘)