

10. 成长叶两面无毛。
12. 叶柄长 6—12 毫米;总状花序的花序梗和花序轴共长 1—2.5 厘米,花冠长 1—1.3 厘米,裂片近匙形……………9. 卵叶梨果寄生 *S. chingii* (Cheng) H. S. Kiu
12. 叶柄长 2—4 毫米;总状花序的花序梗和花序轴共长不及一厘米,花冠长 1.5—1.7 厘米,裂片披针形……………9b. 短柄梨果寄生 *S. chingii* var. *yunnanensis* H.S. Kiu
9. 嫩叶和花具长的叠生星状毛;成长叶下面被绒毛或近无毛;总状花序,具花 4—6 朵,花冠长 0.8—1.5 厘米,裂片披针形。
13. 嫩枝被锈色绒毛,苞片长约 0.5 毫米,花被锈色长绒毛……………10. 锈毛梨果寄生 *S. ferruginea* (Jack) Danser
13. 嫩枝被灰黄色绒毛,苞片长 1.5—2 毫米,花被灰黄色长绒毛……………11. 元江梨果寄生 *S. sootepensis* (Craib) Danser

组 1. 拟梨果组——Sect. *Cichlanthus* (Van Tiegh.) H. S. Kiu, *st. nov.*——*Cichlanthus* Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 42:253. 1895, pro parte——*Loranthus* L. Sect. *Dendrophthoe* Subsect. *Cichlanthus* Endl. Gen. Pl. 802. 1839; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 208. 1886, pro parte——*Loranthus* L. Sect. *Cichlanthus* Oliv. in Journ. Linn. Soc. Bot. 7:100. 1864.——*Loranthus* L. Sect. *Dendrophthoe* ser. *Cichlanthus* (Endl.) Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 16 b:152. 1935, pro parte.

总状花序,稀伞形花序;花蕾顶部椭圆状,稀卵球形,花冠裂片披针形,稀匙形。果棒状、陀螺状或梨形,基部渐狭。

选模式 Lectotyp.: 梨果寄生 *Scurrula philippensis* (Cham. et Schlecht.) G. Don

1. 白花梨果寄生(新拟) 白花寄生(云南植物志)

Scurrula pulverulenta (Wall.) G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. 3: 421. 1834; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 353. 1929, op. cit. 16: 263. 1940; Kanai in Hara, Fl. East. Himal. 1: 65. 1966; 云南植物志 3: 360, pl. 105, 5. 1983.——*Loranthus pulverulentus* Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. 1, 2: 221. 1824; DC. Prodr. 4: 301. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 211. 1886.——*Cichlanthus pulverulentus* (Wall.) Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 42:253. 1895.

灌木,高 1—1.5 米;嫩枝、叶密被白色星状毛和叠生星状毛,稍后毛呈粉状脱落,枝和叶均无毛,小枝暗灰色,具皮孔。叶对生或近对生,薄革质或纸质,阔卵形或卵状长圆形,长 7—15 厘米,宽 6—8 厘米,顶端急尖或圆钝,基部圆形或楔形;侧脉 5—6 对,两面均明显;叶柄长 1.5—2 厘米。总状花序,1—2 个腋生,花序各部分均被白色绒毛,花序轴长 2.5—3.5 厘米,具花 8—16 朵;花梗长约 5 毫米;苞片卵形,长约 1 毫米;花粉白色或浅黄色,花托梨形,长约 3 毫米;副萼环状,全缘;花冠花蕾时管状,长 2.5—4 厘米,稍弯,下半部稍膨胀,顶部椭圆状,开花时顶部 4 裂,裂片披针形,长 9—11 毫米,反折;花丝长 2—3 毫米,花药长 5 毫米;花柱紫红色,柱头近头状。果棒状或梨形,长 6—10 毫米,直径 4 毫

米,具毛。花期8月至翌年1月。

产于云南(盈江、镇康、耿马、临沧、勐海)。海拔(300—)600—1800米山坡或河谷疏林中,寄生于枣树、山牡荆或野桐属植物上。印度北部和东北部、尼泊尔、不丹、缅甸、泰国也有分布。模式标本采自尼泊尔。

2. 高山寄生(中国高等植物图鉴)

Scurrula elata (Edgew.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 350. 1929, et in Blumea **2**: 47.1936; 中国高等植物图鉴补编 **1**:221,图 8475. 1982; 西藏植物志 **1**:578,1983——*Loranthus elatus* Edgew. in Trans. Linn. Soc. **20**:58. 1846; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**:212. 1886.

灌木,高0.5—1.5米;嫩枝、叶密被褐色星状毛,不久毛全脱落;小枝灰褐色至黑褐色,近平滑,具稀疏皮孔。叶对生或互生,革质,卵形或长卵形,长6—10厘米,宽3—5厘米,顶端渐尖,基部圆钝或近心形;侧脉5—6对,两面均明显;叶柄长1—2厘米。总状花序,1—2个腋生或生于小枝已落叶腋部,花序各部分均被疏毛,花序轴长0.5—1.5厘米,具花6—10朵;花梗长3—5毫米;苞片卵形,长约1.5毫米;花红色或红黄色,花托陀螺状,长约2.5毫米;副萼环状,全缘;花冠花蕾时管状,长2.8—3厘米,稍弯,下半部膨胀,直径3毫米,顶部椭圆状,开花时顶部4裂,裂片披针形,长约10毫米,反折;花丝长1.5毫米,花药长5毫米;花柱线状,柱头头状。果陀螺状,浅黄色,长6—8毫米,直径4—5毫米,顶端截平,近基部急狭,果皮平滑。花期5—7月,果期7—8月。

产于西藏(吉隆、聂拉木、定结、措那、墨脱)、云南(腾冲)。海拔(2000—)2400—2850米常绿阔叶林或针叶阔叶混交林中,寄生于栒子属、杜鹃属、荚蒾属、冬青属植物或高山栎上。印度、尼泊尔、不丹也有分布。模式标本采自印度。

3. 贡山梨果寄生(植物分类学报)

Scurrula gongshanensis H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**:176, f.3.1983.

灌木,高约1米;嫩枝、叶密被灰色星状毛,不久毛全脱落,小枝灰褐色,具皮孔。叶通常互生,革质,椭圆形或长卵形,长8—12厘米,宽4—7厘米,顶端钝,基部阔楔形;侧脉3—4对,不明显;叶柄长0.5—1厘米。总状花序,1—3个腋生,具花8—11朵,花序各部分均被星状毛,花序轴长约1.5厘米,花梗长2—3毫米;苞片三角形,长约0.5毫米;花红色,花托梨形,长约2毫米;副萼环状,具4浅齿或波状;花冠花蕾时管状,长3—3.2厘米,稍弯,下半部直径2毫米,顶部椭圆状,裂片4枚,披针形,长6—7毫米,反折;花丝长1—1.5毫米,花药长约4毫米;花柱线状,柱头圆锥状。幼果梨形,长3.5毫米,直径2毫米,果皮被疏毛。花期8—9月。

产于云南(贡山、碧江)。海拔1900—2900米阔叶林中,寄主未详。模式标本采自贡山。

4. 梨果寄生(中国高等植物图鉴)

Scurrula philippensis (Cham. et Schlecht.) G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. **3**: