

442. 1834; Danser in Philip. Journ. Sci. **58**:121.1935, et in Blumea **2**:48.1936; 中国高等植物图鉴补编 **1**:220.1982, 云南植物志 **3**:362, pl. 104, 4—5.1983——*Loranthus philippensis* Cham. et Schlecht. in Linnaea **3**: 204. 1828; Lecomte in Sargent, Pl. Wils. **3**: 317. 1916.——*Cichlanthus philippensis* (Cham. et Schlecht.) Van Tiegh. Bull. Soc. Bot. France **42**:253.1895.——*Loranthus philippensis* var. *macroanthera* Lecomte, Not. Syst. **3**: 166.1915.

灌木, 高 0.7—1 米; 嫩枝、叶、花序和花均密被灰色、灰黄色或黄褐色的星状毛和叠生星状毛; 小枝灰色, 无毛, 具疏生皮孔。叶对生, 薄革质或纸质, 卵形或长圆形, 长 5—10 厘米, 宽 3—6 厘米, 顶端急尖, 基部阔楔形或圆钝, 上面无毛, 下面被绒毛; 侧脉 4—5 对, 略明显; 叶柄长 7—10 毫米, 被毛。总状花序, 1—3 个腋生或生于小枝已落叶腋部, 花序梗长 5—8 毫米, 具花 5—7 朵, 花红色, 密集, 花梗长 1.5—2 毫米; 苞片卵状三角形, 长约 1 毫米; 花托梨形, 长约 2.5 毫米; 副萼环状, 全缘或具 4 齿; 花冠花蕾时管状, 长 2.2—2.5 厘米, 弯曲, 下半部稍膨胀, 顶部椭圆状, 开花时顶部 4 裂, 裂片披针形, 长 6—8 毫米, 反折; 花丝长约 1 毫米, 花药长 2.5(—3) 毫米; 花柱线状, 柱头椭圆状。果梨形, 长约 8 毫米, 直径 3.5 毫米, 近基部渐狭, 被疏星状毛。花期 6—9 月, 果期 11—12 月。

产于云南、贵州西南部、广西(隆林)。海拔 1200—2900 米山地阔叶林中, 常寄生于楸树、油桐、桑树或壳斗科植物上。分布于泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾。模式标本采自菲律宾吕宋。

5. 楠树梨果寄生(新拟)

Scurrula phoebe-formosanae (Hayata) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. **3**, **10**: 352. 1929; Hosok. in Journ. Jap. Bot. **12**: 420. 1936.——*Loranthus phoebe-formosanae* Hayata, Ic. Pl. Formos. **5**: 183. 1915.——*Scurrula lonicericifolia* auct. non Danser: J. M. Chao in Fl. Taiwan **2**: 245. 1976, pro parte min.

灌木, 高约 0.5 米; 嫩枝、叶、花序和花均密被锈色或褐色的叠生星状毛和星状毛; 小枝无毛, 具皮孔。叶对生, 革质, 卵形, 长 4—5 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 顶端钝, 基部圆形, 上面无毛, 下面被绒毛; 侧脉 4—5 对, 在上面明显; 叶柄长 4—6 毫米, 被毛。总状花序, 1—2 个腋生或生于小枝已落叶腋部, 花序梗长约 3 毫米, 具花 3—5 朵, 密集, 花梗长约 2 毫米; 苞片卵状三角形, 长 1—1.5 毫米; 花托梨形, 长 2.5—3 毫米; 副萼环状; 花冠花蕾时管状, 长 1—1.3 厘米, 顶部卵球形, 开花时顶部 4 裂, 裂片近匙形, 长 2.5—3 毫米, 开展; 花丝长 1.5—2 毫米, 花药长 1 毫米; 花柱线状, 柱头头状。果梨形, 长约 9 毫米, 基部渐狭, 被绒毛。花期 4—5 月。

产于福建、台湾。中海拔山地常绿阔叶林中, 寄生于樟科植物上。模式标本采自台湾阿里山。

6. 小叶梨果寄生(新拟) 蓝木桑寄生(海南植物志)