

Scurrula notothixoides (Hance) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 352. 1929, op. cit. **16**: 38. 1938. — *Loranthus notothixoides* Hance in Journ. Bot. **21**: 356. 1883; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 69. 1927; 海南植物志 **2**: 461. 1965. — *Taxillus notothixoides* (Hance) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **11**: 445. 1931.

灌木, 高约 0.5 米; 嫩枝、叶、花序和花均密被黄褐色叠生星状毛和星状毛; 小枝无毛, 具皮孔。叶对生或近对生, 纸质, 倒卵形或卵圆形, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 顶端圆钝, 基部楔形, 上面被疏毛, 下面被绒毛; 侧脉通常 1 对, 略明显; 叶柄长 2—7 毫米, 被毛。伞形花序, 1—3 个腋生或生于小枝已落叶腋部, 总花梗长 1—4 毫米, 具花 (1—) 2 (—3) 朵, 花梗长 1—2 毫米; 苞片匙形, 长 3—5 毫米; 花黄褐色或红褐色, 花托梨形, 长 2—3.5 毫米; 副萼环状, 全缘; 花冠花蕾时管状, 长 2.4—3 厘米, 稍弯, 上半部稍膨胀, 顶部卵球形, 开花时顶部 4 裂, 裂片匙形, 长约 4 毫米, 反折; 花丝长 1—1.5 毫米, 花药长 1.5 毫米; 花柱线状, 柱头近头状。果棒状, 长 10 毫米, 直径约 3.5 毫米, 顶端截平, 中部以下渐狭, 浅黄色或橙色, 具疏毛。 花果期 9 月至翌年 3 月。

产于广东海南岛和雷州半岛。海拔 25—200 米沿海平原或低山常绿阔叶林中, 寄生于倒吊笔、蓝树、三叉苦、鹊肾树、酸橙等植物上。越南也有分布。模式标本采自广东临高。

组 2. 梨果组 —— Sect. *Scurrula*

总状花序, 花蕾顶部椭圆状, 稀卵球形, 花冠裂片披针形, 稀近匙形; 果梨形, 下半部骤狭呈柄状。

组模式种: 红花寄生 *Scurrula parasitica* L.

7. 红花寄生 (中国高等植物图鉴) 柠檬寄生 (广东), 柏寄生 (植物名实图考)

Scurrula parasitica L. Sp. Pl. 110. 1753; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 352. 1929, op. cit. **16**: 34. 1938; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 220, 图 8474. 1982; 丘华兴, 植物分类学报 **21**: 175. 1983; 云南植物志 **3**: 362. 1983. — *Loranthus scurrula* L. Sp. Pl. ed. 2, **1**: 472. 1762. — *Cichlanthus scurrula* (L.) Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France **42**: 253. 1895. — *Loranthus parasiticus* (L.) Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 232. 1919. — *L. chinensis* DC. var. *formosanus* Lecomte in Sargent, Pl. Wils. **3**: 316. 1916. — *L. chinensis* auct. non DC.: Benth. Fl. Hongk. 141. 1861. — *L. gracilifolius* auct. non Schult.: 海南植物志 **2**: 459, 图 523. 1965.

7a. 红花寄生 (原变种) 图版 26: 1—6

Scurrula parasitica L. var. ***parasitica***

灌木, 高 0.5—1 米; 嫩枝、叶密被锈色星状毛, 稍后毛全脱落, 枝和叶变无毛, 小枝灰