

Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 209 1886.

灌木,高0.5—2米;嫩枝、叶、花序和花均密被灰黄色星状毛和短叠生星状毛,小枝浅褐色,无毛,具散生皮孔。叶对生、纸质或革质,卵形或长卵形,长6—7(—10)厘米,宽3.5—4(—8)厘米,顶端急尖,基部钝或圆钝,上面无毛,下面被绒毛;侧脉5对,两面均明显;叶柄长约5毫米,被毛。总状花序,2—5个簇生于叶腋或小枝已落叶腋部,花序梗和花序轴共长2—5毫米,具花4—5(—7)朵,花红色,密集,花梗长1—1.5毫米;苞片卵形,长1毫米;花托梨形,长2.5—3毫米;副萼环状,具缘毛;花冠花蕾时管状,长1.5—1.6(—1.8)厘米,微弯,冠管稍膨胀,顶部椭圆形,裂片4枚,披针形,长约5毫米,反折;花丝长1.5—3毫米,花药长1.5—2毫米,药隔突出;花柱红色,柱头头状。果梨形,长8—10毫米,直径3.5—4毫米,下半部渐狭呈柄状,被星状毛。花期1—12月。

产于西藏(察隅、墨脱)、云南西北部、西部和中部、四川(米易)。海拔(1100—)1250—2200米河谷或山地阔叶林中,寄生于桃树、梨树、马桑、一担柴或莨菪属、柯属等植物上。印度东北部也有分布。模式标本采自印度。

9. 卵叶梨果寄生(新拟) 卵叶寄生

Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin 21: 175. 1983; 云南植物志 3: 363. 1983. — *Loranthus chingii* Cheng in Sinensia 4(11): 327, f. 1. 1934.

9a. 卵叶梨果寄生(原变种)

Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu var. *chingii*

灌木,高约1米;嫩枝、叶、花序和花均密被锈色叠生星状毛和星状毛;小枝灰色,无毛,具皮孔。叶对生或近对生,革质,卵形、卵圆形或长卵形,长6—11厘米,宽4—7厘米,顶端圆钝,有时钝尖头,基部圆形,有时浅心形,上面无毛,下面被星状毛或无毛;侧脉4—5对,在上面明显;叶柄长6—12毫米,被毛。总状花序,2—3个腋生或生于小枝已落叶腋部,花序梗和花序轴共长1—2.5厘米,具花7—14朵,花红褐色或黄褐色,花梗长1—2毫米;苞片卵形,长约1毫米;花托陀螺状,长约3毫米;副萼环状,全缘;花冠花蕾时管状,长1—1.3厘米,下半部稍膨胀,顶部卵球形,开花时顶部4裂,裂片近匙形,长3—5毫米,反折;花丝长1.5毫米,花药长约1毫米;花柱线状,柱头近头状。果梨形,黄色,长9—10毫米,直径约3毫米,下半部骤狭呈柄状,果皮被星状毛。花期9月至翌年4月。

产于云南南部和东南部、广西西部和西南部。海拔90—1100米低山或山地常绿阔叶林中,寄生于油茶、木油桐、木菠萝、白饭树、普洱茶等植物上。越南北部也有分布。模式标本采自广西扶绥。

9b. 短柄梨果寄生(变种) 澜沧江寄生(云南植物志)

Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu var. *yunnanensis* H. S. Kiu in Fl. Yunnan. 3: 364. 1983.

本变种的成长叶两面均无毛,叶柄短,长2—4毫米;总状花序,花序梗和花序轴共长