

6—9 毫米,具花 6—9 朵,花被黄褐色绒毛;花冠长 1.5—1.7 厘米,裂片披针形,长 6—7 毫米;花丝长 2 毫米,花药长 2 毫米。果梨形,长 8 毫米,下半部呈柄状。花期 10 月至翌年 2 月,果期 3—5 月。

产于云南(盈江、澜沧、勐海、勐腊)。海拔 500—1300 米山地常绿阔叶林中,寄生于石榴、夹竹桃或柿属、蒲桃属、木姜子属等植物上。模式标本采自勐腊。

10. 锈毛梨果寄生(新拟) 滇南寄生

Scurrula ferruginea (Jack) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 350. 1929, op. cit. 11: 432. 1931, et in Blumea 2: 47. 1936; 云南植物志 3: 364. pl. 105, 1—4. 1983. —*Loranthus ferrugineus* Jack, Mal. Miscell. 1: 279, t. 59. 1820. —*Cichlanthus ferrugineus* (Jack) Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 42: 253. 1895.

灌木,高约 1 米;嫩枝、叶密被锈色长的和短的叠生星状毛,稍后毛呈粉状脱落;小枝灰色,无毛,具皮孔。叶对生,薄革质,阔椭圆形或卵形,长 5—10 厘米,宽 2—5 厘米,顶端钝或近圆形,基部圆形或浅心形,上面无毛,下面疏生短的叠生星状毛或近无毛;侧脉 5—8 对,两面均略明显;叶柄长 2—5 毫米。总状花序,1—2 个腋生,花序和花密被锈色长的叠生星状毛,花序梗和花序轴共长 3—10 毫米,具花 4—6 朵,花褐色,通常 3—4 朵密集呈轮伞状;花梗长 1—1.5 毫米;苞片三角形,长约 0.5 毫米;花托卵球形,长 4 毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长 0.8—1.5 厘米,稍弯,下半部膨胀,顶部椭圆状,开花时顶部 4 裂,裂片披针形,长约 4.5 毫米,反折;花丝长 1 毫米,花药长约 1 毫米;花柱线状,柱头头状。果梨形,长 8—10 毫米,直径 3—4 毫米,下半部骤狭呈柄状,被叠生星状毛;果梗长约 3 毫米,稍下弯。花期 10 月至翌年 2 月。

产于云南西南部和南部。海拔 900—1800 米山地常绿阔叶林中,寄生于余甘子树李属、柑桔属等植物上。缅甸、老挝、越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚也有分布。模式标本采自马来西亚。

11. 元江梨果寄生(新拟) 元江寄生

Scurrula sootepensis (Craib) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 353. 1929; 云南植物志 3: 364. 1983. —*Loranthus sootepensis* Craib in Kew Bull. 1911: 454. 1911; Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 192. 1915, et in Sargent, Pl. Wils. 3: 317. 1916. —*Scurrula ferruginea* (Jack) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 16: 37. 1938, pro. min. parte, quoad specim. A. Henry 10315.

灌木,高约 1 米;嫩枝、叶、花序和花均密被灰黄色叠生星状毛和星状毛。叶对生,纸质,卵形或长卵形,长 7—8 厘米,宽 4—4.5 厘米,顶端钝的,基部圆钝,上面无毛,下面被绒毛;叶柄长 8—10 毫米。总状花序,2—3 个腋生或生于小枝已落叶腋部,花序梗和花序轴共长 5—7 毫米,具花 4—5 朵,花黄褐色,密集,花梗长 1.5—2 毫米;苞片卵状三角形,长 1.5—2 毫米;花托梨形,长 4 毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长 1.2 厘米,顶部椭圆状,