

6—9 毫米,具花 6—9 朵,花被黄褐色绒毛;花冠长 1.5—1.7 厘米,裂片披针形,长 6—7 毫米;花丝长 2 毫米,花药长 2 毫米。果梨形,长 8 毫米,下半部呈柄状。花期 10 月至翌年 2 月,果期 3—5 月。

产于云南(盈江、澜沧、勐海、勐腊)。海拔 500—1300 米山地常绿阔叶林中,寄生于石榴、夹竹桃或柿属、蒲桃属、木姜子属等植物上。模式标本采自勐腊。

10. 锈毛梨果寄生(新拟) 滇南寄生

Scurrula ferruginea (Jack) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 350. 1929, op. cit. 11: 432. 1931, et in Blumea 2: 47. 1936; 云南植物志 3: 364. pl. 105, 1—4. 1983. — *Loranthus ferrugineus* Jack, Mal. Miscell. 1: 279, t. 59. 1820. — *Cichlanthus ferrugineus* (Jack) Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 42: 253. 1895.

灌木,高约 1 米;嫩枝、叶密被锈色长的和短的叠生星状毛,稍后毛呈粉状脱落;小枝灰色,无毛,具皮孔。叶对生,薄革质,阔椭圆形或卵形,长 5—10 厘米,宽 2—5 厘米,顶端钝或近圆形,基部圆形或浅心形,上面无毛,下面疏生短的叠生星状毛或近无毛;侧脉 5—8 对,两面均略明显;叶柄长 2—5 毫米。总状花序,1—2 个腋生,花序和花密被锈色长的叠生星状毛,花序梗和花序轴共长 3—10 毫米,具花 4—6 朵,花褐色,通常 3—4 朵密集呈轮伞状;花梗长 1—1.5 毫米;苞片三角形,长约 0.5 毫米;花托卵球形,长 4 毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长 0.8—1.5 厘米,稍弯,下半部膨胀,顶部椭圆状,开花时顶部 4 裂,裂片披针形,长约 4.5 毫米,反折;花丝长 1 毫米,花药长约 1 毫米;花柱线状,柱头头状。果梨形,长 8—10 毫米,直径 3—4 毫米,下半部骤狭呈柄状,被叠生星状毛;果梗长约 3 毫米,稍下弯。花期 10 月至翌年 2 月。

产于云南西南部和南部。海拔 900—1800 米山地常绿阔叶林中,寄生于余甘子树李属、柑桔属等植物上。缅甸、老挝、越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚也有分布。模式标本采自马来西亚。

11. 元江梨果寄生(新拟) 元江寄生

Scurrula sootepensis (Craib) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 353. 1929; 云南植物志 3: 364. 1983. — *Loranthus sootepensis* Craib in Kew Bull. 1911: 454. 1911; Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 192. 1915, et in Sargent, Pl. Wils. 3: 317. 1916. — *Scurrula ferruginea* (Jack) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 16: 37. 1938, pro. min. parte, quoad specim. A. Henry 10315.

灌木,高约 1 米;嫩枝、叶、花序和花均密被灰黄色叠生星状毛和星状毛。叶对生,纸质,卵形或长卵形,长 7—8 厘米,宽 4—4.5 厘米,顶端钝的,基部圆钝,上面无毛,下面被绒毛;叶柄长 8—10 毫米。总状花序,2—3 个腋生或生于小枝已落叶腋部,花序梗和花序轴共长 5—7 毫米,具花 4—5 朵,花黄褐色,密集,花梗长 1.5—2 毫米;苞片卵状三角形,长 1.5—2 毫米;花托梨形,长 4 毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长 1.2 厘米,顶部椭圆状,

裂片4枚,披针形,长约4毫米,稍开展;花丝长1.5毫米,花药长约1.5毫米。果梨形,长9毫米,直径4毫米,下半部骤狭呈柄状,被绒毛。 花期5—6月。

产于云南(勐腊、金平)。海拔650—1000米常绿阔叶林中,寄生于五月茶属、铁青树属等植物上。泰国也有分布。模式标本采自泰国清迈。

7. 钝果寄生属——*Taxillus* Van Tiegh.

Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France **42**: 256. 1895; Danser in Bull.

Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 354. 1929, et in Verhand. Kon.

Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, **29**(6): 123. 1933;

丘华兴,植物分类学报 **21**: 177. 1982.

寄生性灌木;嫩枝、叶通常被绒毛。叶对生或互生;侧脉羽状。伞形花序,稀总状花序,腋生,具花2—5朵;花4—5数,两侧对称,每朵花具苞片1枚;花托椭圆状或卵球形,稀近球形,基部圆钝;副萼环状,全缘或具齿;花冠在成长的花蕾时管状,稍弯,下半部多少膨胀,顶部椭圆状或卵球形,开花时顶部分裂,下面一裂缺较深,裂片4—5枚,反折;雄蕊着生于裂片的基部,花丝短,花药4室,药室具横隔或无;子房1室,基生胎座,花柱线状,约与花冠等长,具棱,柱头通常头状。浆果椭圆状或卵球形,稀近球形,顶端具宿存副萼,基部圆钝,外果皮革质,具颗粒状体或小瘤体,稀平滑,被毛或无毛,中果皮具粘胶质;种子1颗。

模式种:钝果寄生 *T. tomentosus* (Roth.) Van Tiegh.

约25种,分布于亚洲东南部和南部。我国产15种、5变种,分布于西南和秦岭以南各省区。

分 种 检 索 表

1. 叶互生或在短枝上簇生;伞形花序,花冠无毛,花蕾顶部椭圆状,花冠裂片披针形[组 1. 簇生叶组 Sect. *Phyllodesmis* (Van Tiegh.) H. S. Kiu].
 2. 全株无毛,叶卵形、长椭圆形或披针形,宽1.5—2厘米;花序具花2—4朵,花冠长2—3厘米;果椭圆状……………1. 柳叶钝果寄生 *T. delavayi* (Van Tiegh.) Danser
 2. 嫩枝、叶被绒毛,叶线形或近匙形、狭椭圆形,宽0.3—1.2厘米;果近球形或卵球形。
 3. 叶长1.5—3.5厘米,宽0.3—0.7厘米,仅中脉明显,花序具花2—3朵,果皮具颗粒状体。
 4. 花托无毛。
 5. 花冠长1.5—1.6厘米,花药长约2毫米……………2. 小叶钝果寄生 *T. kaempferi* (DC.) Danser
 5. 花冠长3厘米,花药长4毫米……………