

圆形,长约2毫米;花红色,花托椭圆状,长约2.5毫米;副萼环状,全缘或具4浅齿,稀具撕裂状芒;花冠花蕾时管状,长2—3厘米,稍弯,顶部椭圆状,裂片4枚,披针形,长6—9毫米,反折;花丝长约2毫米,花药长3—4毫米;花柱线状,柱头头状。果椭圆状,长8—10毫米,直径4毫米,黄色或橙色。花期2—7月,果期5—9月。

产于西藏东部、云南、四川、贵州西部、广西(凌云)。海拔(1500—)1800—3500米高原或山地阔叶林或针叶、阔叶混交林中,寄生于花楸、山楂、樱桃、梨树、桃树、马桑或柳属、桦属、栎属、槭属、杜鹃属等植物,稀云南油杉上。缅甸、越南北部也有分布。模式标本采自云南丽江。

全株入药,四川民间治孕妇腰痛、安胎等。

2. 小叶钝果寄生(新拟) 华东松寄生(中国高等植物图鉴),松胡颓子(浙江),葛萝松(安徽)

*Taxillus kaempferi* (DC.) Danser in Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. sect. 2, 29(6): 124. 1933, et in Blumea 2: 49. 1936, pro parte, quoad Ching 2402; 中国高等植物图鉴补编 1: 224. 1982. — *Viscum kaempferi* DC. Prodr. 4: 285. 1830. — *Loranthus kaempferi* (DC.) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 22: Sep. 230. 1876. — *Phylloidesmis kaempferi* (DC.) Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 43: 118. 1896.

2a. 小叶钝果寄生(原变种) 图版 27:1—5

*Taxillus kaempferi* (DC.) Danser var. *kaempferi*

灌木,高0.5—1米;嫩枝、叶密被褐色星状毛,稍后毛全脱落,小枝灰褐色,具小瘤体和疏生皮孔。叶小,革质,互生或2—4枚簇生于短枝上,线形或近匙形,长1.5—3厘米,宽3—7毫米,顶端圆钝,基部楔形,干后暗褐色,中脉略明显;叶柄长1—2毫米。伞形花序,1—2个腋生,具花2—3朵,总花梗长2—3毫米;花梗长2—3毫米;苞片兜状,长约1毫米,顶端常3浅裂;花深红色,无毛,花托近球形,长约1.5毫米;副萼环状,具4裂缺;花冠花蕾时管状,长1.5—1.6厘米,顶部椭圆状,裂片4枚,披针形,长约5毫米,反折;花丝长约1毫米,花药长约2毫米;花柱线状,柱头头状。果卵球形,直径4—5毫米,红褐色,果皮具颗粒状体。花期7—8月,果期翌年4—5月。

产于安徽(黄山)、江西(武夷山)、福建(崇安、浦城)、浙江南部。海拔(900—)1000—1600米山地针叶、阔叶混交林中,寄生于马尾松、黄山松、南方铁杉等植物上。日本也有分布。模式标本采自日本。

2b. 黄杉钝果寄生(变种) 四川松寄生

*Taxillus kaempferi* (DC.) Danser var. *grandiflorus* H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sinica 21: 177. 1983. — *Loranthus caloreas* Diels var. *oblongifolius* Lecomte in Sargent, Pl. Wils. 3: 315. 1916. nom. nud.