

本变种的叶线形,长3—3.5厘米,宽4—5.5毫米,基部阔楔形;叶柄长1毫米或几无。花序具花2—3朵,总花梗长1.5—2毫米;花梗长1.5—2毫米;苞片长约1毫米;花红色,花托椭圆状,长2毫米;花冠长约3厘米,裂片4枚,披针形;花药长4毫米。果卵球形,红色。花期7—8月,果期翌年5—6月。

产于四川西部和东部、湖北西部。海拔1000—2800米山地针叶林中,寄生于黄杉属植物上。模式标本采自四川丹巴。

3. 松柏钝果寄生(新拟) 松寄生(中国高等植物图鉴)

Taxillus calcoreas (Diels) Danser in Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. sect. 2, **29**(6): 123. 1933; 中国高等植物图鉴 补编 **1**: 224, 图 8477. 1982; 云南植物志 **3**: 366, pl. 106, 4—5. 1983.——*Loranthus calcoreas* Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 251. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 158. 1929.——*L. matsudai* Hayata, Ic. Pl. Formos. **10**: 30. 1921, *syn. nov.*——*Phyllodesmis calcoreas* (Diels) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 349. 1929.——*Taxillus matsudai* (Hayata) Danser in l. c. 124. 1933; J. M. Chao in Fl. Taiwan **2**: 250, pl. 286. 1976.

3a. 松柏钝果寄生(原变种) 图版 27:6—10

Taxillus calcoreas (Diels) Danser var. **calcoreas**

灌木,高0.5—1米;嫩枝、叶密被褐色星状毛,稍后毛全脱落,小枝黑褐色,具瘤体。叶互生或簇生于短枝上,革质,近匙形或线形,长2—3厘米,宽3—7毫米,顶端圆钝,基部楔形,干后,暗褐色,中脉明显;叶柄长1—2.5毫米。伞形花序,1—2个腋生,具花2—3朵,总花梗长1—2(—3)毫米或几无;花梗长1—2毫米;苞片阔三角形或阔卵形,长约1毫米,顶端急尖,稀3浅裂;花瓣红色,花托卵球形,长约1.5毫米,被褐色绒毛;副萼环状,近全缘或具裂缺;花冠花蕾时管状,长2—2.7厘米,无毛,稍弯,下半部稍膨胀,顶部椭圆状,裂片4枚,披针形,长7—8毫米,反折;花丝长约2毫米,花药长4毫米;花柱线状,柱头头状。果近球形,长4—5毫米,直径3—5毫米,紫红色,果皮具颗粒状体。花期7—8月,果期翌年4—5月。

产于西藏(亚东、错那、察隅、波密)、云南、四川、贵州(威宁)、湖北、广西(大瑶山)、广东(乳源)、福建、台湾等省区。海拔900—2800(—3100)米山地针叶林或针叶阔叶混交林中,寄生于松属、油杉属、铁杉属、云杉属或雪松属植物上。不丹也有分布。模式标本采自云南丽江。

据 *Loranthus matsudai* 模式标本 Matsuda s. n. 及原始记载具形态特征与本种一致,应予归并。

枝、叶作药用,民间用于治风湿性关节炎、胃痛等。

3b. 显脉钝果寄生(变种) 显脉松寄生(云南植物志)

Taxillus calcoreas (Diels) Danser var. **fargesii** (Lecomte) H. S. Kiu in Fl.