

Yunnan. **3**: 368. 1983. — *Loranthus calorceas* Diels var. *fargesii* Lecomte, Not. Syst. **3**: 49, f. 1. 1914, et in Sargent, Pl. Wils. **3**: 315. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 159. 1929.

本变种的叶线形至狭椭圆形，长 3—4.5 厘米，宽 7—12 毫米，干后暗绿色；中脉和侧脉均明显。花序具花 4—5(—6) 朵，总花梗长 (2—) 3—4 毫米，花梗长 3—4 毫米；苞片兜状，长约 2 毫米，顶部初具疏毛，不久毛脱落；花冠长 3—3.2 厘米。果近球形，长 5—8 毫米，紫黑色，果皮平滑。花期 6—9 月，果期 12 月至翌年 5 月。

产于云南、四川、湖北。海拔 1000—3000 米山地针叶林中，寄生于云南油杉、云南松或云杉属植物，稀寄生于三年桐。模式标本采自四川城口。

组 2. 披针裂片组——Sect. *Lancilobi* H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**: 178. 1983.

叶对生或近对生。伞形花序，稀总状花序；花 4 数，花蕾的顶部椭圆状，花冠被毛，裂片披针形。果椭圆状。

模式种：木兰寄生 *Taxillus limprichtii* (Grüning) H. S. Kiu

本组有 8 种，我国产 7 种、3 变种。

4. 台湾钝果寄生(新拟)

Taxillus theifer (Hayata) H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**: 179. 1983. — *Loranthus theifer* Hayata, Ic. Pl. Formos. **5**: 186. 1915. — *Scurrula theifer* (Hayata) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 353. 1929. — *S. ritozanensis* auct. non (Hayata) Danser: J. M. Chao in Fl. Taiwan **2**: 248, pl. 285. 1976, pro parte, quoad Sasaki s. n., Morimoto 790.

灌木，高约 1 米；芽密被灰褐色短星状毛，小枝和成长叶均无毛，小枝灰色，具皮孔。叶近对生，薄革质，椭圆形或倒卵状长圆形，长 4—5 厘米，宽 1.1—2 厘米，顶端圆钝，基部楔形；侧脉 3—4 对，略明显；叶柄长 3—5 毫米。伞形花序，2—3 个腋生或生于小枝已落叶腋部，具花 3—5 朵，花序和花均被星状毛，稍后毛变稀疏，总花梗长 3—4 毫米；花梗长 2.5—3 毫米；苞片阔三角形，长约 1 毫米；花托椭圆状，长约 2 毫米；副萼环状，具 4 齿；花冠花蕾时管状，长 1.7—2 厘米，稍弯，下半部稍膨胀，顶部椭圆状，裂片 4 枚，披针形，长约 7 毫米，反折；花丝长 1.5—2 毫米，花药长 2.5—3 毫米；花柱线状，柱头头状。果椭圆状，长 7—8 毫米，直径 3.5—4 毫米，两端钝圆，果皮具小瘤体。花果期 11 月至翌年 2 月。

产于台湾南部。海拔 500—800 米山地常绿阔叶林中，寄生于黄荆等植物上。模式标本采自台湾屏东。

5. 木兰寄生(植物分类学报) 粤桑寄生(海南植物志)

Taxillus limprichtii (Grüning) H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**: 178. 1983;