

5—7对,在叶上面明显。花序具花2—4朵,各部均密被栗褐色叠生星状毛和星状毛,总花梗长4—6毫米,花梗长4—4.5毫米;花冠长2.2—2.8厘米,裂片披针形,长6—8毫米;花丝长约1毫米,花药长4—5毫米,顶端圆钝或具浅缺。果椭圆状,长6—8毫米,果皮具小瘤体。花期8—10月,果期10—12月。

产于云南(西畴)、广西、广东海南岛和东部、福建、台湾。海拔500—700(—1400)米山地常绿阔叶林中,寄生于枫香、八角、桂花、油桐、柿树、夹竹桃等植物上。越南、泰国也有分布。模式标本采自台湾南投。

5c. 亮叶木兰寄生(变种) 亮叶寄生(植物分类学报) 图版 28:10—11

Taxillus limprichtii (Grüning) H. S. Kiu var. **longiflorus** (Lecomte) H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. 21: 178. 1983; 云南植物志 3: 368. 1983. —— *Loranthus estipitatus* Stapf var. *longiflorus* Lecomte in Sargent, Pl. Wils. 3: 316. 1916.

本变种的嫩枝密被栗褐色叠生星状毛和星状毛;成长叶长圆形至长卵形,长7—12厘米,宽4—6厘米,顶端钝头的渐尖或变钝,侧脉在叶上面明显。花序具花3—5朵,各部均被栗褐色星状毛,总花梗长2—3毫米,花梗长3—3.5毫米;花冠长3.2—3.5厘米,裂片披针形,长9—10毫米;花丝长1.5—2毫米,花药长5—7毫米。果椭圆状,长8—9毫米,果皮具细小瘤体。花期5—8月,果期8—12月。

产于云南南部。海拔1700—2200米山地常绿阔叶林中,寄生于普洱茶属或壳斗科、樟科植物上。模式标本采自思茅。

6. 龙陵钝果寄生(新拟) 龙陵寄生(云南植物志)

Taxillus sericus Danser in Blumea 2: 50, f. 1, a—b. 1936; 云南植物志 3: 369. 1983.

灌木,高0.5—1米;嫩枝、叶密被褐色星状毛,稍后毛全脱落,小枝灰褐色,具皮孔。叶互生或近对生,薄革质或革质,长卵形或卵状长圆形,长6—10厘米,宽2.5—4.5厘米,顶端短渐尖或急尖,基部楔形,稍下延;侧脉5—6对,侧脉和部分网脉在叶两面均明显;叶柄长1—1.5厘米。伞形花序,1—3个腋生或生于小枝已落叶腋部,具花2—4朵,总花梗长2.5—4毫米;花梗长3—4毫米,具疏毛;苞片卵形,长约1毫米;花橙红色,初被褐色星状毛,花托椭圆状,长2.5—3毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长2—3厘米,稍弯,下半部膨胀,顶部椭圆状,裂片4枚,披针形,长7—8毫米,反折;花丝几无或长约1毫米,花药长3—4毫米;花柱线状,柱头头状。果椭圆状,长约8毫米,直径约5毫米,果皮具颗粒状体,无毛。花果期8月至翌年2月。

产于云南西北部和西部。海拔1500—2000(—2700)米山地阔叶林中,寄生于旱冬瓜或桦木属,壳斗科植物上。锡金也有分布。模式标本采自云南龙陵。

7. 伞花钝果寄生(植物分类学报)

Taxillus umbelifer (Schult.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 11: