

10. 滇藏钝果寄生(新拟) 金沙江寄生(云南植物志), 梨寄生(云南)

Taxillus thibetensis (Lecomte) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 355. 1929, et in Blumea **2**: 51. 1936. excl. syn. *Loranthus duclouxii* Lecomte; 云南植物志 **3**: 370. 1983. — *Loranthus thibetensis* Lecomte, Not. Syst. **3**: 168. 1915.

灌木, 高 0.5—1 米; 嫩枝、叶密被黄褐色或褐色叠生星状毛和星状毛, 小枝黑色, 近平滑, 具疏生皮孔。叶对生, 革质, 卵形或长卵形, 长 5—8 厘米, 宽 3—4.5 厘米, 顶端圆钝或钝尖, 基部近圆形, 上面无毛, 下面被紧贴的绒毛; 叶缘常呈浅波状; 侧脉 5—8 对, 在叶上面明显; 叶柄长 8—12 毫米, 具疏毛。伞形花序, 2—3 个簇生于叶腋或小枝已落叶腋部, 具花 3—5 朵, 花序和花均密被黄褐色或褐色绒毛, 总花梗长 1—2 毫米; 花梗长 2—3 毫米; 苞片卵状三角形, 长约 1 毫米; 花红色, 花托椭圆状, 长约 2 毫米; 副萼环状, 具不整齐 4 齿或全缘; 花冠花蕾时管状, 长 2.2—3.2 厘米, 稍弯, 下半部膨胀, 顶部椭圆状, 裂片 4 枚, 披针形, 长 7—8 毫米, 反折, 开花后毛变稀疏; 花丝长 1.5—2 毫米, 花药长 3.5—4 毫米, 药室常具横隔; 花柱线状, 柱头头状。果卵球形或椭圆状, 长 5—10 毫米, 直径 4—6 毫米, 浅黄色, 果皮具颗粒状体, 被疏毛。花期 5—9 月, 果期 8—10 月。

产于西藏东南部、云南、四川西南部。海拔 1700—2700(—3000) 米山地阔叶林中, 常寄生于梨树、柿树板栗、李树或栎属等植物上。模式标本采自云南维西。

组 3. 匙形裂片组——Sect. *Spathulilobi* H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**: 181. 1983.

叶对生, 稀互生。伞形花序, 稀总状花序; 花 4 数, 花蕾的顶部卵球形, 花冠被毛, 裂片匙形。果椭圆状或卵球形。

模式种: 广寄生 *Taxillus chinensis* (DC.) Danser

本组有 6 种, 我国产 5 种。

11. 广寄生(植物分类学报) 桑寄生(广东), 桃树寄生(广东), 寄生茶(广西) 图版 29: 1—6

Taxillus chinensis (DC). Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **16**: 40. 1938; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 222. 1982. — *Loranthus chinensis* DC. Mem. Loranth. **28**, t. 7. 1830, et Prodr. **4**: 301. 1830. — *L. estipitatus* Stapf in Trans. Linn. Soc. Bot. **4**: 221. 1894; Lecomte, Not. Syst. **3**: 72. 1914; Engl. u. Krause in Engl. u. Prandl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **16** b: 157. 1935. — *Taxillus estipitatus* (Stapf) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 355. 1929, et in l. c. **11**: 445. 1931. — *Loranthus parasiticus* auct. non Merr.: 广州植物志 411, 图 215. 1956; 海南植物志 **2**: 461. 1965; 中国高等植物图鉴 **1**: 538, 图 1076. 1972.

灌木, 高 0.5—1 米; 嫩枝、叶密被锈色星状毛, 有时具疏生叠生星状毛, 稍后绒毛呈粉状脱落, 枝、叶变无毛; 小枝灰褐色, 具细小皮孔。叶对生或近对生, 厚纸质, 卵形至长卵

形,长(2.5—)3—6厘米,宽(1.5—)2.5—4厘米,顶端圆钝,基部楔形或阔楔形;侧脉3—4对,略明显;叶柄长8—10毫米。伞形花序,1—2个腋生或生于小枝已落叶腋部,具花1—4朵,通常2朵,花序和花被星状毛,总花梗长2—4毫米;花梗长6—7毫米;苞片鳞片状,长约0.5毫米;花褐色,花托椭圆状或卵球形,长2毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长2.5—2.7厘米,稍弯,下半部膨胀,顶部卵球形,裂片4枚,匙形,长约6毫米,反折;花丝长约1毫米,花药长3毫米,药室具横隔;花盘环状;花柱线状,柱头头状。果椭圆状或近球形,果皮密生小瘤体,具疏毛,成熟果浅黄色,长8—10毫米,直径5—6毫米,果皮变平滑。花果期4月至翌年1月。

产于广西、广东、福建南部。海拔20—400米平原或低山常绿阔叶林中,寄生于桑树,桃树,李树,龙眼,荔枝,杨桃,油茶,油桐,橡胶树,榕树,木棉或马尾松,水松等多种植物上。越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚(加里曼丹)、菲律宾也有分布。模式标本采自广东广州市。

全株入药,药材称“广寄生”,系中药材桑寄生主要品种,可治风湿痹痛、腰膝痠软、胎动、胎漏、高血压等。民间草药以寄生于桑树、桃树、马尾松的疗效较佳;寄生于夹竹桃的有毒,不宜药用。

12. 栗毛钝果寄生(植物分类学报) 栗毛寄生(云南植物志) 图版 29: 7—10。

Taxillus balansae (Lecomte) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 11: 445. 1931, op. cit. 16: 42. 1938;丘华兴,植物分类学报 21: 181, f. 4. 1983;云南植物志 3: 370, pl. 107, 3. 1983.——*Loranthus balansae* Lecomte, Not. Syst. 3: 73. 1914, et Fl. Gén. Indo-Chine 5: 192. 1915.——*L. tienyensis* Li in Journ. Arn. Arb. 24: 364. 1943.

灌木,高1—2米;嫩枝、叶、花序和花均密被栗褐色叠生星状毛,小枝和叶的绒毛呈粉状逐渐全脱落;小枝灰色,具散生皮孔。叶对生或近对生,革质,椭圆形或卵圆形,长2.5—6厘米,宽1.5—3.5厘米,顶端圆钝,基部阔楔形至圆形;侧脉3—4对,略明显;叶柄长5—7毫米。伞形花序,腋生,稀生于小枝已落叶腋部,具花(1—)2(—3)朵,总花梗长3—5毫米;花梗长6—8毫米;苞片三角形,长1—1.5毫米;花红褐色,花托椭圆状或卵球形,长2.5—3毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长3.5—4厘米,稍弯,下半部膨胀,顶部卵球形,裂片4枚,匙形,长约8毫米,反折;花丝长约1毫米,花药长约2毫米;花柱线状,具四棱,近顶部八棱,柱头头状。果椭圆状,长9—10毫米,直径4—5毫米,顶端截平,果皮具颗粒状体,被疏毛。花期3—12月,果期4—12月。

产于云南东南部、广西西南部和南部。海拔400—1200米山地常绿阔叶林中,寄生于枫树、石栗、荷树、马尾树或木兰科、壳斗科等植物上。越南北部也有分布。模式标本采自越南三位(巴威山)。

13. 毛叶钝果寄生(新拟) 桑寄生(四川、湖南、江西),寄生泡(四川、陕西),毛叶寄



1—6. 广寄生 *Taxillus chinensis* (DC.) Danser: 1. 花枝; 2. 花蕾; 3. 花; 4. 雄蕊; 5. 幼果(具小瘤体); 6. 星状毛。7—10. 栗毛钝果寄生 *T. balansae* (Lecomte) Danser: 7. 花枝; 8. 花蕾; 9. 果(具颗粒状体); 10. 叠生星状毛。(余汉平绘)