

小枝已落叶腋部,具花2—3朵,总花梗长1—2毫米;花梗长约1毫米;苞片三角形,长约1毫米;花红褐色,花托卵球形,长2—2.5毫米;副萼环状;花冠花蕾时管状,长1.2—1.8厘米,稍弯,下半部膨胀,顶部卵球形,裂片4枚,匙形,长5—7毫米,反折;花丝长3.5毫米,花药长1.5毫米;花柱线状,柱头头状。果椭圆状,长约8毫米,直径约5毫米,顶端截平,橙黄色,果皮具颗粒状体,被疏毛或无毛。 花果期7—11月。

产于西藏(吉隆)、云南。海拔(1800—)2300—3000米山地阔叶林中,常寄生于栎属植物上。印度、尼泊尔也有分布。模式标本采自尼泊尔。

15. 锈毛钝果寄生(植物分类学报) 图版 30: 6—8

Taxillus levinei (Merr.) H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **21**: 181. 1983. — *Loranthus levinei* Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 233. 1919. — *Scurrula levinei* (Merr.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 351. 1929. — *Taxillus rutilus* Danser in Blumea **3**: 402, pl. 15. 1940.

灌木,高0.5—2米;嫩枝、叶、花序和花均密被锈色,稀褐色的叠生星状毛和星状毛;小枝灰褐色或暗褐色,无毛,具散生皮孔。叶互生或近对生,革质,卵形,稀椭圆形或长圆形,长4—8(—10)厘米,宽(1.5—)2—3.5(—4.5)厘米,顶端圆钝,稀急尖,基部近圆形,上面无毛,干后榄绿色或暗黄色,下面被绒毛,侧脉4—6对,在叶上面明显;叶柄长6—12(—15)毫米,被绒毛。伞形花序,1—2个腋生或生于小枝已落叶腋部,具花(1—)2(—3)朵,总花梗长2.5—5毫米;花梗长1—2毫米;苞片三角形,长0.5—1毫米;花红色,花托卵球形,长约2毫米;副萼环状,稍内卷;花冠花蕾时管状,长(1.8—)2—2.2厘米,稍弯,冠管膨胀,顶部卵球形,裂片4枚,匙形,长5—7毫米,反折;花丝长2.5—3毫米,花药长1.5—2毫米;花盘环状;花柱线状,柱头头状。果卵球形,长约6毫米,直径4毫米,两端圆钝,黄色,果皮具颗粒状体,被星状毛。 花期9—12月,果期翌年4—5月。

产于云南东南部、广西、广东、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、福建。海拔200—700(—1200)米山地或山谷常绿阔叶林中,常寄生于油茶、樟树、板栗或壳斗科植物上。模式标本采自广东连县。

全株药用,有祛风除湿功效。

本种近似日本钝果寄生 *Taxillus yadoriki* Sieb. ex Maxim., 但区别是本种的花冠较短,被锈色绒毛等。

8. 大苞寄生属——*Tolypanthus* (Blume) Reichb.

Reichb. Repert. Herb. Sive Nomencl. Gen. Pl. **73**. 1841. — *Loranthus* L. Sect. *Tolypanthus* Blume, Fl. Javac Loranth. **18**. 1830. — *Tolypanthus* (Blume) Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France **42**: 248. 1895.

寄生性灌木。叶互生或对生，具叶柄。密簇聚伞花序，腋生，具花3—6朵，花梗短或几无；每朵花具苞片1枚，苞片叶状，轮生，离生或彼此连合，呈总苞状；花两性，5数，辐射对称，花托卵球形；副萼杯状，花冠在成长的花蕾时管状，直立，上半部膨胀，顶部卵球形，开花时顶部分裂，裂片5枚，反折；雄蕊着生于裂片^{3,4}的基部，花丝短，花药4室；子房1室，基生胎座，花柱线状，具5棱，约与花冠等长，柱头头状。浆果椭圆状，外果皮革质，被疏毛，中果皮具粘胶质；种子1颗。

模式种：印度大苞寄生 *Tolypanthus involucratus* (Roxb.) Van Tiegh.

约5种；分布于亚洲南部(印度、锡金、斯里兰卡)和东部(中国)。我国产2种，分布于贵州、湖南、广西、广东、江西、福建。

分 种 检 索 表

1. 密簇聚伞花序的总花梗长7—11毫米，花梗长约1毫米；苞片长卵形，长12—22毫米，宽7—11毫米，基部圆钝或浅心形……………1. 大苞寄生 *T. maclurei* (Merr.) Danser
1. 密簇聚伞花序的总花梗长4—6毫米，花梗长1.5—2毫米；苞片披针形，长18—27毫米，宽3—6毫米，基部楔形……………2. 黔桂大苞寄生 *T. esquirolii* (Lévl.) Lauenr
1. 大苞寄生(中国高等植物图鉴) 图版 31: 1—7

Tolypanthus maclurei (Merr.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 355. 1928; 中国高等植物图鉴补编 1: 226. 1982; 丘华兴, 广西植物 4: 125. 1984. — *Loranthus maclurei* Merr. in Philip Journ. Sci. 21: 494. 1922; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 158. 1928; 中国高等植物图鉴 1: 539, 图 1077. 1972.

灌木，高0.5—1米；幼枝、叶密被黄褐色或锈色星状毛，稍后毛全脱落；枝条披散状，淡黑色，平滑。叶薄革质，互生或近对生，或3—4枚簇生于短枝上，长圆形或长卵形，长2.5—7厘米，宽1—3厘米，顶端急尖或钝，基部楔形或圆钝；叶柄长2—7毫米。密簇聚伞花序，1—3个生于小枝已落叶腋部或腋生，具花3—5朵，总花梗长7—11毫米，花梗长约1毫米；苞片长卵形，淡红色，长12—22毫米，宽7—11毫米，顶端渐尖，基部圆钝或浅心形，具直出脉3—7条，干后纸质；花红色或橙色，花托卵球形，长约2毫米，被黄褐色或锈色绒毛；副萼杯状，长约1毫米，具5浅齿；花冠长2—2.8厘米，具疏生星状毛，冠管上半部膨胀，具5纵棱，纵棱之间具横皱纹，裂片狭长圆形，长6—8毫米，反折；花丝长2—2.5毫米，花药长1.5—2毫米。果椭圆状，长8—10毫米，直径约6毫米，黄色，具星状毛，宿存副萼长约1毫米。花期4—7月，果期8—10月。

产于贵州南部和东部、广西、湖南、江西西部和南部、广东、福建西南部。海拔150—900(—1200)米山地、山谷或溪畔常绿阔叶林中，寄生于油茶、槲木、柿树、紫薇或杜鹃属、杜英属、冬青属等植物上。模式标本采自广东揭西县。