

Buitenzorg ser. 3, **16**: 56. 1938, et in Blumea **4**: 280. 1941; Sesh. Rao in Journ. Ind. Bot. Soc. **36**: 126, f. 5. 1957, pro parte; 海南植物志 **2**: 465. 1965; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 229. 1982; 云南植物志 **3**: 377, pl. 109, 3—4. 1983.

亚灌木, 高 0.3—0.5 米, 直立或披散, 茎基部近圆柱状, 枝和小枝均扁平; 枝交叉对生或二歧地分枝, 节间长 1.5—2.5 厘米, 宽 2—3 毫米, 稀长 3—4 厘米, 宽 3.5 毫米, 干后边缘薄, 具纵肋 3 条, 中肋明显。叶退化呈鳞片状。聚伞花序, 1—3 个腋生, 总花梗几无, 总苞舟形, 长约 1.5 毫米, 具花 3—1 朵, 中央 1 朵为雌花, 侧生的为雄花, 通常仅具 1 朵雌花或 1 朵雄花; 雄花: 花蕾时球形, 长 0.5—1 毫米, 萼片 4 枚; 花药圆形, 贴生于萼片下半部; 雌花: 花蕾时椭圆状, 长 1—1.5 毫米, 基部具环状苞片; 花托卵球形; 萼片 4 枚, 三角形, 长约 0.5 毫米; 柱头垫状。果球形, 直径 3—4 毫米, 白色或青白色, 果皮平滑。花果期几全年。

产于云南、广西、广东。海拔 50—1200 (—1700) 米沿海平原或山地亚热带季雨林中, 常寄生于桑寄生科的鞘花、五蕊寄生、广寄生、小叶梨果寄生等的茎上, 也寄生于壳斗科、大戟科、樟科、檀香科植物上。亚洲南部和东南部各国、大洋洲热带地区均有分布。模式标本采自印度尼西亚。

据在广东鼎湖山及罗浮山观察, 本种除以重寄生形式寄生于鞘花或广寄生外, 也直接寄生于罗浮椎、秋枫等植物上。

10. 枫香树寄生 (中国高等植物图鉴) 枫树寄生、螃蟹脚 (广东英德), 桐树寄生 (四川), 赤柯寄生 (台湾) 图版 34: 8—12

Viscum liquidambaricolum Hayata, Ic. Pl. Formos. **5**: 194, f. 71, 72. 1915; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **16**: 57. 1938, et in Blumea **4**: 289. 1941; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 229, 图 8482. 1982; 丘华兴, 植物分类学报 **22**: 208. 1984. — *V. bongariense* Hayata, Ic. Pl. Formos. **5**: 190, f. 65, 66. 1915. — *V. querci-morii* Hayata Ic. Pl. Formos. **5**: 196, f. 74, pl. 13. 1915. — *V. articulatum* Burm. f. var. *liquidambaricolum* (Hayata) Sesh. Rao in Journ. Ind. Bot. Soc. **36**: 133, f. 7, 8. 1957; Kanai in Hara, Fl. East. Himal. **1**: 65. 1966. — *V. articulatum* auct. non Burm. f.: Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 407. 1894; Lecomte in Sargent, Pl. Wils. **3**: 318. 1916; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 69. 1927, pro parte — *Aspidixia articulata* auct. non Van Tiegh.: J. M. Chao in Fl. Taiwan **2**: 238, pl. 281. 1976.

灌木, 高 0.5—0.7 米, 茎基部近圆柱状, 枝和小枝均扁平; 枝交叉对生或二歧地分枝, 节间长 2—4 厘米, 宽 4—6 (—8) 毫米, 干后边缘肥厚, 纵肋 5—7 条, 明显。叶退化呈鳞片状。聚伞花序, 1—3 个腋生, 总花梗几无, 总苞舟形, 长 1.5—2 毫米, 具花 3—1 朵, 通常仅具一朵雌花或雄花, 或中央一朵为雌花, 侧生的为雄花; 雄花: 花蕾时近球形, 长约 1 毫米, 萼片 4 枚; 花药圆形, 贴生于萼片下半部; 雌花: 花蕾时椭圆状, 长 2—2.5 毫米,

花托长卵球形,长1.5—2毫米,基部具杯状苞片或无;萼片4枚,三角形,长0.5毫米;柱头乳头状。果椭圆状,长5—7毫米,直径约4毫米,有时卵球形,长6毫米,直径约5毫米,成熟时橙红色或黄色,果皮平滑。 花果期4—12月。

产于西藏南部和东南部、云南、四川、甘肃(文县)、陕西南部、湖北、贵州、广西、广东、湖南、江西、福建、浙江(平阳)、台湾。海拔200—750米(西南地区1100—2500米)山地阔叶林中或常绿阔叶林中,寄生于枫香、油桐、柿树或壳斗科等多种植物上。尼泊尔、印度东北部、泰国北部、越南北部、马来西亚、印度尼西亚爪哇也有分布。模式标本采自台湾。

全株入药,治风湿性关节疼痛、腰肌劳损,民间以寄生于枫香树上的为佳;云南思茅民间则以本种用于治急性膀胱炎。


本种分布范围广,在我国南亚热带地区观察,其枝条肥厚扁平,雌花椭圆状等,与扁枝槲寄生的形态及生长习性等有明显差别,系不同种群。此外本种枝条的节间长度和宽度,可随寄主种类稍有变化,其果实的形状和颜色亦有不同,若寄生于枫香树上的,其果椭圆状,成熟时橙红色;寄生于油桐树上的,其幼果椭圆状,成熟时呈卵球形,黄色。

11. 棱枝槲寄生(海南植物志) 柿寄生(广东、福建、台湾), 桐木寄生(广西)

Viscum diospyrosicolum Hayata, Ic. Pl. Formos. **5**: 192, f. 67, 68. 1915, op. cit. **6**: 41, f. 4. 1916; Danser in Blumea **4**: 291. 1941; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 230. 图 8483. 1982; 云南植物志 **3**: 378. 1983. — *V. filipendulum* Hayata, l. c. 193. 1915. — *V. angulatum* auct. non Heyne ex DC.: Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 234. 1919; 海南植物志 **2**: 465. 1965. — *V. ramosissimum* auct. non Wight et Arnott: Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 160. 1929. — *Aspidixia angulata* auct. non Van Tiegh.: J. M. Chao in Fl. Taiwan **2**: 238. 1976.

亚灌木,高0.3—0.5米,直立或披散,枝交叉对生或二歧地分枝,位于茎基部或中部以下的节间近圆柱状,小枝的节间稍扁平,长1.5—2.5(—3.5)厘米,宽2—2.5毫米,干后具明显的纵肋2—3条。幼苗期具叶2—3对,叶片薄革质,椭圆形或长卵形,长1—2厘米,宽3.5—6毫米,顶端钝,基部狭楔形;基出脉3条;成长植株的叶退化呈鳞片状。聚伞花序,1—3个腋生,总花梗几无;总苞舟形,长1—1.5毫米,具花3—1朵;3朵花时中央1朵为雌花,侧生的为雄花,通常仅具1朵雌花或雄花;雄花:花蕾时卵球形,长1—1.5毫米,萼片4枚,三角形;花药圆形,贴生于萼片下半部;雌花:花蕾时椭圆状,长1.5—2毫米,基部具环状苞片或无;花托椭圆状;萼片4枚,三角形,长约0.5毫米;柱头乳头状。果椭圆状或卵球形,长4—5毫米,直径3—4毫米,黄色或橙色,果皮平滑。 花果期4—12月。

产于西藏(察隅)、云南、贵州、四川、甘肃(文县)、湖北、湖南、广西、广东、江西、福建、浙江、陕西(安康)、台湾。海拔20—1000米(西南地区2100米)平原或山地常绿阔叶林中,寄生于柿树、樟树、梨树、油桐或壳斗科等多种植物上。模式标本采自台湾。



1—7. 扁枝槲寄生 *Viscum articulatum* Burm. f.: 1. 果枝; 2. 聚伞花序; 3. 雄花; 4. 花药着生位置; 5. 幼果; 6. 果; 7. 一段小枝。8—12. 枫香槲寄生 *V. liquidambaricolum* Hayata: 8. 果枝; 9. 聚伞花序; 10. 雄花; 11. 果; 12. 一段小枝。(余汉平绘)