

3. 下花细辛(台湾植物志)

Asarum hypogynum Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 144. f.53.1915.

模式标本采自台湾阿里山。

二、下列两种因未见模式标本,在原产地目前未采到类似标本,故暂存疑。

4. 短柱细辛

Asarum brevistylum Franch. in Journ. de Bot. 12: 301. 1898.

模式标本采自四川城口。

据原记载与双叶细辛 *A. caulescens* Maxim. 接近,但本种花被裂片直立或平展,绝不反折,花柱长仅一毫米。在模式产地城口县,尚未见有此类型的植物,故暂存疑。

5. 南漳细辛

Asarum sprengeri Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 10(8):113. 1911; 湖北植物志 1: 209. 1976.

模式标本采自湖北南漳附近。

原记载没有对花柱和柱头的描述。按其描述接近川北细辛 *A. chinense* Franch. 但有不同点,如叶面绿色,花梗较长,花较大,花被管上端不缢缩成短颈。因未见湖北有类似标本,故暂存疑。

3. 线果兜铃族——Trib. Bragantieae

Klotzsch in Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 583. 1859; Duchartre in A. DC. Prodr. 15(1):427.1864; O. C. Schmidt in Engl. u. Plantl. Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 16b:232 1935; M. P. Greg. in Amer. Journ. Bot. 43(2):121.1956. — *Cyclodiscineae* Klotzsch. l. c. 583. — *Apameae* Solereder in F. P. I. Aufl. 3(1):271.1889.

直立或攀援状灌木。叶互生,全缘,有叶柄。花排成总状花序或聚伞花序;花被1轮,辐射对称;檐部3裂,裂片常近相等;雄蕊6—12枚,排成1—2轮,围绕花柱,花丝短或无,分离或合生;子房下位。蒴果长角果状;种子具三棱形。

本族2属,我国产1属。

3. 线果兜铃属——*Thottea* Rottb.

Rottb. Nyc Samling Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 2:529. 1783; Klotzsch in Monatsb. Akad. Berlin 588. 1859; Duchartre in A. DC. Prodr. 15(1):428.1864. — *Apama* Lam. Encycl. Method. Bot. 1:91.