

围绕在中间,胚根在下方。

仅1种,分布于甘肃西南部。

1. 苞藜 图版 14: 1—7

Baolia bracteata Kung et G. L. Chu in 植物分类学报 16:120.1978.

一年生草本,高10—18厘米。根细而弯曲,上端直径约1.5毫米。茎直立,下部有分枝,常带紫红色。叶卵状椭圆形至卵状披针形,长1—2.2厘米,宽5—10毫米,先端短渐尖,基部楔形,背面主侧脉明显并稍有污粉;叶柄长2—10毫米。花簇通常含2—4花;苞片狭卵形,腹面稍凹,长约0.5毫米,膜质而具稍厚的绿色中心部;小苞片狭卵形或三角形,膜质,长0.3—0.5毫米;花被裂至中部,果时裂片长0.8—1毫米,具膜质边缘和褐色脉;花盘环形;花丝透明膜质,长约0.75毫米,基部宽上部狭,花药长约0.15毫米;柱头丝状,长约0.1毫米,稍外弯。胞果暗褐色,长约2毫米,宽约1.7毫米,顶端露出花被外,基部突隆,表面具极整齐的蜂窝状深洼。种子黑褐色,与果皮不易剥离,胚乳白色。花果期8—10月。

产甘肃迭部县,生于阳山坡。


种子含丰富淀粉。

17. 藜属——*Chenopodium* L.

L. Gen. Pl. ed. 5, 103. 1754.

一年生或多年生草本,很少为半灌木(中国无此类),有囊状毛(粉)或圆柱状毛,较少为腺毛或完全无毛,很少有气味。叶互生,有柄;叶片通常宽阔扁平,全缘或具不整齐锯齿或浅裂片。花两性或兼有雌性,不具苞片和小苞片,通常数花聚集成团伞花序(花簇),较少为单生,并再排列成腋生或顶生的穗状,圆锥状或复二歧式聚伞状的花序;花被球形,绿色,5裂,较少为3—4裂裂片腹面凹,背面中央稍肥厚或具纵隆脊,果时花被不变化,较少增大或变为多汁,无附属物;雄蕊5或较少,与花被裂片对生,下位或近周位,花丝基部有时合生;花药矩圆形,不具附属物;花盘通常不存在;子房球形,顶基稍扁,较少为卵形;柱头2,很少3—5,丝状或毛发状,花柱不明显极少有短花柱;胚珠几无柄。胞果卵形,双凸镜形或扁球形;果皮薄膜质或稍肉质,与种子贴生,不开裂。种子横生,较少为斜生或直立;种皮壳质,平滑或具点洼,有光泽;胚环形,半环形或马蹄形;胚乳丰富,粉质。

本属约250种,分布遍及世界各处。我国产19种和2亚种。



图版 14 1-7. 苞藜 *Baolia bracteata* Kung et G. L. Chu 1. 植株; 2. 花被; 3. 雄蕊及子房; 4. 苞片; 5. 小苞片; 6. 胞果; 7. 胚。