

约1毫米,黑色或黑红色,有光泽,表面略有浅沟纹,边缘具锐棱。花果期7—9月。

产河北、山西、陕西、甘肃至新疆南部。生于山谷、河岸、道旁等处。分布于美洲、欧洲、伊朗及苏联的东南部。

19. 藜(礼记) 灰藜(本草纲目)、灰菜(救荒本草) 图版19: 1—4

Chenopodium album L. Sp. Pl. 219. 1753; Moq. in DC. Prodr. 13(2): 70. 1849; Maxim. Prim. Fl. Amur. 476. 1859; Benth. Fl. Hongkong. 282. 1861; Franch. Pl. David. 247. 1884; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 3. 1886; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 161. 1929; 中国北部植物图志 4: 59. t. 20. f. 1—6. 1935; 广州植物志 142. 1956; 江苏南部种子植物手册 244. f. 383. 1959; 东北草本植物志 2: 97. 1959; 中国高等植物图鉴 1: 578. f. 1156. 1972.

一年生草本,高30—150厘米。茎直立,粗壮,具条棱及绿色或紫红色色条,多分枝;枝条斜升或开展。叶片菱状卵形至宽披针形,长3—6厘米,宽2.5—5厘米,先端急尖或微钝,基部楔形至宽楔形,上面通常无粉,有时嫩叶的上面有紫红色粉,下面多少有粉,边缘具不整齐锯齿;叶柄与叶片近等长,或为叶片长度的1/2。花两性,花簇于枝上部排列成或大或小的穗状圆锥状或圆锥状花序;花被裂片5,宽卵形至椭圆形,背面具纵隆脊,有粉,先端或微凹,边缘膜质;雄蕊5,花药伸出花被,柱头2。果皮与种子贴生。种子横生,双凸镜状,直径1.2—1.5毫米,边缘钝,黑色,有光泽,表面具浅沟纹;胚环形。花果期5—10月。

分布遍及全球温带及热带,我国各地均产。生于路旁、荒地及田间,为很难除掉的杂草。

幼苗可作蔬菜用,茎叶可喂家畜。全草又可入药,能止泻痢,止痒,可治痢疾腹泻;配合野菊花煎汤外洗,治皮肤湿毒及周身发痒。果实(称灰藜子),有些地区代“地肤子”药用。

本种分布甚广,形态变异很大,已发表的种下等级名称很多,相当混乱。我们认为非进行世界性的整理工作难于弄清楚,这里暂不细分,统归入本种之内。

vii. 樟味藜族——*Camphorosmeae* Moq.

花两性或兼有单性,无小苞片;花被大多5裂,较少3—4裂,通常有毛;花药无附属物;叶无明显的叶柄。



图版 19 1—4. 藜 *Chenopodium album* L. 1. 枝; 2. 叶; 3. 花被; 4. 种子。5—7. 杂配藜 *C. hybridum* L. 5. 枝; 6—7. 种子; 8—10. 小藜 *C. serotinum* L. 8. 枝; 9. 叶; 10. 种子。11—13. 灰绿藜 *C. glaucum* L. 11. 枝; 12. 花被及胞果; 13. 种子。(蔡淑琴绘)