

当年生枝密生白色柔毛；叶有极密的贴伏长绢毛。

产新疆北部。生于戈壁、沙地、干山坡。

### 2. 尖翅地肤 图版 21: 16—18

**Kochia odontoptera** Schrenk in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Petersb. 1: 361. 1843, excl. var. altera; Bunge in Act. Hort. Petrop. 6 (2): 417. 1880; Litv. in Bornm. in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 8: 546, 1908; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 48. 1966. ——**K. schrenkiana** (Moq.) Iljin in Fl. URSS 6: 132. t. 5. f. 8. 1936. ——**K. odontoptera** Schrenk var. **schrenkiana** Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 132. 1849.

一年生草本，高 15—30 厘米。茎直立，有条棱，无色条，有灰白色棉毛；分枝较稀疏，外倾或斜上，细弱，通常稍弯曲。叶为平面叶，条形，长 0.5—1.2 厘米，宽 1—2.5 毫米，先端短渐尖，基部渐狭，两面都有密长绢毛。花两性，通常 2—3 朵团集于叶腋；花被带绿色，近球形，有半贴伏的淡黄色柔毛；花被裂片广卵形，先端急尖；花被翅状附属物膜质，淡黄褐色，略呈披针形，边缘撕裂状，先端尾状长渐尖，长 2—3.5 毫米，开展或向上；雄蕊 5，花丝伸出于花被外，花药矩圆形，长约 0.4 毫米；花柱极短，柱头 2，丝状，淡黄色。胞果卵形，果皮膜质，稍带白色，平滑。种子横生，暗红褐色，长约 0.8 毫米；胚环形，胚乳块状，褐色。花果期 5—7 月。


产新疆北部。生于沙丘、台地等处。伊朗和苏联中亚地区也有分布。

### 3. 伊朗地肤 图版 21: 19—21

**Kochia iranica** Litv. ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 8: 546. 1908; Iljin in Fl. URSS 6: 131. t. 5. f. 12; Kitam. Fl. Afghan. 103. 1960. ——**Kochia odontoptera** Schrenk var. **altera** Schrenk in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 1: 361. 1843. ——**Bassia iranica** Bornm. in Repert. Sp. Nov. 17: 276. 1921.

一年生草本，高达 50 厘米，全株有密棉毛，呈灰白色。茎直立，下部木质化，通常有极多的分枝；分枝多集中在茎的上部，较硬直，不规则伸展，黄白色或带紫红色。叶为平面叶，无柄，有半贴伏的长柔毛；茎上部叶卵形至椭圆形，通常长 1.5—3 毫米，宽 1—2 毫米；茎下部叶条形至矩圆状条形，长可达 1.8 厘米，先端急尖或短渐尖，基部渐狭。花两性，通常 2—3 朵团集于叶腋；花被绿色，有密柔毛；花被的翅状附属物菱形至扇形，膜质，具多条黄褐色脉纹，前部边缘啮蚀状；柱头 2，丝状，外伸，花柱短，约等于柱头长的 1/4。胞果卵形，果皮厚膜质。种子暗褐色，平滑，无光泽，长约 1 毫

图版 22



图版 22 1—3. 雾冰藜 *Bassia dasypylla* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze 1. 果枝; 2. 果时的花被;  
3. 胚。4—7. 肉叶雾冰藜 *B. sedoides* (Pall.) Aschers. 4. 果枝; 5. 果时的花被; 6. 枝条一段;  
7. 叶。8—10. 钩刺雾冰藜 *B. hyssopifolia* (Pall.) O. Kuntze 8. 果枝; 9. 果时的花被; 10. 叶。(蔡淑琴绘)