

18. 小灌木; 叶基部有关节; 柱头锥状, 直立(广东、广西、福建、台湾及江苏沿海)……
18. 南方碱蓬 *S. australis* Moq.
18. 一年生草本; 叶基部无关节; 柱头丝形, 叉开或稍弯曲。
 19. 叶通常呈镰刀状弯曲, 先端钝(新疆南部)
19. 镰叶碱蓬 *S. crassifolia* Pall.
19. 叶直或不规则弯曲, 先端尖或急尖(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、浙江、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆)
20. 盐地碱蓬 *S. salsa* (L.) Pall.

组 1. 柄花组 Sect. Schanginia (C. A. Mey.) Valkens

团伞花序着生在叶片基部, 其总梗与叶柄合并呈短枝状; 半灌木或一年生草本。

1. 小叶碱蓬 图版 24: 11—12

Suaeda microphylla (C. A. Mey.) Pall. Ill. Pl. 52. t. 44. 1803; Bunge in Act. Hort. Petrop. 6 (2): 426. 1880; Boiss. Fl. Orient. 938. 1879; Iljin in Fl. URSS 6: 179. 1936; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 76. 1966.——*Schoberia microphylla* C. A. Mey. Verzeichn. Pflz. Cauc. 159. 1831.——*Chenopodina microphylla* Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 163. 1849.


半灌木, 高达 1 米。茎直立, 灰褐色, 圆柱状, 有条棱, 幼嫩时有密短柔毛及薄蜡粉, 多分枝; 枝硬直, 开展。叶圆柱状, 下部的长达 1 厘米, 宽约 1 毫米, 上部的较短, 通常长不超过 3 毫米, 灰绿色, 稍弧曲, 先端具短尖头, 基部骤缩。团伞花序通常含 3—5 花, 着生于叶柄上; 花两性兼有雌性; 花被肉质, 灰绿色, 5 裂至中部, 裂片矩圆形, 先端兜状, 背面凸隆, 果时稍增大, 下半部稍膨胀; 雄蕊 5, 花药矩圆形, 长约 0.5 毫米; 柱头 2 或 3, 花柱不明显。胞果包于花被内, 果皮膜质, 黑褐色。种子直立或横生, 卵形, 稍高, 长约 1.1 毫米, 黑色, 有光泽, 花纹不明显, 周边钝。

产新疆北部。生于戈壁、沙丘、湖边、盐碱荒漠。分布于中亚至苏联高加索。

2. 木碱蓬 图版 24: 9—10

Suaeda dendroides (C. A. Mey.) Moq. Chenop. Monogr. Enum. 126. 1840; Bunge in Act. Hort. Petrop. 6 (2): 426. 1880; Iljin in Fl. URSS 6: 181. 1936; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 74. 1966.——*Schoberia dendroides* C. A. Mey. Verzeichn. Pflz. Cauc. Casp. 159. 1831.——*Chenopodina dendroides* Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 164. 1849.

半灌木, 高 20—60 厘米。茎直立, 茎皮灰褐色至灰白色, 多分枝; 小枝细瘦, 淡黄



图版 24 1—2. 碱蓬 *Suaeda glauca* (Bunge) Bunge 1. 枝; 2. 果时的花被。3—4. 高碱蓬 *S. altissima* (L.) Pall. 3. 枝; 4. 果时的花被。5—6. 亚麻叶碱蓬 *S. linifolia* Pall. 5. 枝; 6. 花被。7—8. 奇异碱蓬 *S. paradoxa* Bunge 7. 枝; 8. 花被。9—10. 木碱蓬 *S. dendroides* (C. A. Mey.) Moq. 9. 枝; 10. 花被。11—12. 小叶碱蓬 *S. microphylla* Pall. 11. 枝; 12. 花被。(蔡淑琴、张泰利绘)