

厚,不具附属物;花药宽卵形,长约0.5毫米;柱头2,近锥形,不外弯,黄褐色至黑褐色,有乳头突起,花柱不明显。胞果扁,圆形,果皮膜质,易与种子分离。种子双凸镜状,直径约1毫米,黑褐色,有光泽,表面有微点纹。花果期7—11月。

产广东、广西、福建、台湾、江苏。生于海滩沙地、红树林边缘等处,常成片群生。分布于大洋洲及日本南部。

据前人记载,我国台湾、广东还产 *S. monoica* Forsk., 但我们未查到标本,很可能是本种的错误鉴定。

19. 镰叶碱蓬 图版 30: 4—5


Suaeda crassifolia Pall. Illustr. 54. t. 46. 1803; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 73. 1966.——*Schoberia obtusifolia* Bunge, Reliq. Lehmann. 290. 1852.——*Suaeda drepanophylla* Litv. in Sched. ad Herb. Fl. Ross. 4: 109. 1908; Iljin in Fl. URSS 6: 196. 1936.

一年生草本,高20—50厘米。茎直立,通常多分枝,苍白色或黄白色,无毛及色条,下部圆柱状,上部具微条棱。叶条形,圆柱状,长7—15毫米,粗1.5—2毫米,通常蓝绿色,向上呈镰刀状弯曲,先端钝,基部微收缩;枝上部的叶较短,广椭圆形至近圆形。团伞花序含4—12花或更多,于枝上部集成有间断的穗状圆锥状花序;花两性,有时兼有雌性;花被星状,直径1.5—2毫米;花被裂片卵形,不等大,果时基部向外延伸成角状或三角状突起;小苞片卵形或倒卵形,顶缘有微齿;雄蕊5,花药宽椭圆形,长约0.3毫米;柱头2,黑褐色,花柱不明显。种子横生或斜生,卵形,稍压扁,长约1毫米,宽约0.8毫米,红褐色至黑色,有光泽,具细微网纹。花期6—7月,果期8—9月。

产新疆南部。生于盐碱土荒漠、河滩、湖边等处。伊朗、苏联中亚地区至高加索地区也有分布。

20. 盐地碱蓬(中国北部植物图志) 翅碱蓬(东北草本植物志) 黄须菜(河北) 碱葱(内蒙古) 图版 29: 5—7

Suaeda salsa (L.) Pall. Illustr. 46. 1803; Bunge in Bull. Ac. Sci. St. Pétersb. 25: 360. 1879 et in Act. Hort. Petrop. 6: 428. 1880; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 330. 1889—1902; 北研丛刊 2 (2): 18. 1933; Iljin in Fl. URSS 6: 191. 1936. p. p.; Grobov, Pl. Asiae Centr. 2: 77. 1966.——*S. heteroptera* Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. 4, 4: 79. 1936 et Lineam. Fl. Mansh. 193. 1939; 东北草本植物志 2: 72. 1959.



图版 30 1—3. 异子蓬 *Borszczowia aralocaspica* Bunge 1. 枝; 2. 大型胞果; 3. 小型胞果。
 4—5. 镰叶碱蓬 *Suaeda crassifolia* Pall. 4. 枝; 5. 种子。6—7. 囊果碱蓬 *S. physophora* Pall. 6. 枝;
 7. 花被。8—10. 角果碱蓬 *S. corniculata* (C. A. Mey.) Bunge 8. 枝; 9. 花被; 10. 种子。(张泰
 利、蔡淑琴绘)