

1. 浆果苋属*——*Cladostachys* D. Don

D. Don, Prodr. Pl. Nepal. 76. 1825; O. Ktze. Revis. Gen. Pl. 1:541. 1891. — *Deeringia* R. Br. Prodr. 413. 1810; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 23. 1880; Schinz in Engl u. Prantl, Pflanzenfam. 3 (1a): 97. 1893 et 2. Aufl. 16c, 26. 1934. non *Deeringia* Adans. 1763.

直立草本、亚灌木、披散或攀援状灌木。叶互生，具叶柄。花两性或单性异株，成腋生及顶生穗状或总状花序，或由总状花序组成圆锥花序；每花有1苞片及2小苞片；花被片5，少为4，干膜质或革质，宿存，无毛，微开展，反折或直立；雄蕊5，少为4，花丝基部连合成杯状，花药2室；无退化雄蕊；子房上位，卵形或近球形，1室，有少数或多数胚珠，柱头2—3，少为4，条形或圆柱形，基部连合。浆果球形、宽椭圆形或倒卵形，具薄壁，不裂，成熟时从宿存花被脱落；种子少数或多数，圆形或肾形，种皮壳状，光亮，黑色或棕黑色，具小斑点或光滑，有胚乳。

约7—8种，分布在马达加斯加、大洋洲及亚洲南部的热带地区；我国产2种。

分种检索表

1. 总状花序或圆锥花序；花被片花后反折；雄蕊花丝基部不扩大；胚珠1—6个；柱头圆柱状；浆果红色；攀援灌木（四川、云南、西藏、广西、广东、台湾）……………1. 浆果苋 *C. frutescens* D. Don
1. 穗状花序；花被片紧贴果实；雄蕊花丝基部扩大，合生成杯状；胚珠10个以上；柱头背部扁平；浆果白色；直立草本或亚灌木（台湾、广东海南岛）……………2. 白浆果苋 *C. polysperma* (Roxb.) Kuan

1. 浆果苋 地苓苋（中国种子植物词典）、地灵苋（海南植物志）、野苋菜藤（云南） 图版44: 5—7

Cladostachys frutescens D. Don, l. c. 76. — *Achyranthes amaranthoides* Lam. Encycl. Method. Bot. 1: 548. 1785. — *Deeringia celosioides* R. Br. l. c. 413; Hance in Journ. Bot. new ser. 7: 232. 1878; Lévl. Catal. Pl. Yunnan 7. 1915. — *Deeringia amaranthoides* (Lam.) Merr. Bur. Sci. Publ. Manila 9: 211. 1917 et in Lingn. Sci. Journ. 5: 72. 1927; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 185. 1929; Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Formos. 5: 18. 1932;

* 属的异名：地灵苋属（植物分类学报二卷三期）、地苓苋属（中国种子植物科属词典）。