

黑棕色，边缘锐。花期7—8月，果期9月。

产黑龙江、河北、新疆。生在人家附近、路旁及杂草地上。原产北美，传布于欧洲、苏联高加索、中亚、远东地区及日本。

9. 细枝苋 图版47：4

Amaranthus gracilentus Kung in Chin. Journ. Bot. 1: 14. pl. 5. 1936.

一年生草本，高80—100厘米；茎上升或近直立，具棱，从基部分枝，黄绿色，无毛，茎和分枝细。叶片匙形或椭圆状倒卵形，长1—4厘米，宽5—18毫米，顶端圆钝，有时尖凹，具凸尖，基部渐狭，全缘，无毛，白色，叶柄细，长1—4毫米。花簇具1花或少数疏生花，在叶腋及枝顶端成穗状花序，雄花单生，在下部花簇的中部；苞片及小苞片钻形，长约2毫米，舟状，背面具1绿色隆起中脉；花被片2或3，条形或钻形，长1毫米，透明，有1绿色隆起中脉；雄蕊1—3，比花被片稍长；子房卵形，皱缩，和花被片等长，柱头2或3，钻形，稍弯曲。花期9月。

产河北。生在海拔580米山坡阴湿处。模式标本采自井陉县苍岩山。

和白苋相近，但本种叶片匙形或椭圆状倒卵形，较长且较宽，顶生穗状花序较细长，可以区别。

10. 腋花苋 罗氏苋(中国北部植物图志) 图版46: 11—13

Amaranthus roxburghianus Kung in 中国北部植物图志 4: 19. pl. 8. 1935; 秦岭植物志 1 (2), 183. 1974.

一年生草本，高30—65厘米；茎直立，多分枝，淡绿色，全体无毛。叶片菱状卵形、倒卵形或矩圆形，长2—5厘米，宽1—2.5厘米，顶端微凹，具凸尖，基部楔形，波状缘；叶柄长1—2.5厘米，纤细。花成腋生短花簇，花数少且疏生；苞片及小苞片钻形，长2毫米，背面有1绿色隆起中脉，顶端具芒尖；花被片披针形，长2.5毫米，顶端渐尖，具芒尖；雄蕊比花被片短；柱头3，反曲。胞果卵形，长3毫米，环状横裂，和宿存花被略等长。种子近球形，直径约1毫米，黑棕色，边缘加厚。花期7—8月，果期8—9月。

产河北、山西、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆。生在旷地或田地旁。印度、斯里兰卡有分布。

11. 北美苋

Amaranthus blitoides S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts et Sc. 12: 273. 1877; Vassil. in Fl. URSS 6: 363. t. 18. f. 7a—7b. 1936; Ki-



图版 47 1—3 白苋 *Amaranthus albus* L. 1. 花枝; 2. 雌花; 3. 雄花; 4—8 绿果苋 *A. viridis* L. 4. 花枝; 5—8 果实; 5. 花枝; 6. 雄花; 7. 雌花; 8. 果实。9—12 四头苋 *A. lividus* L. 9. 花枝; 10. 雌花; 11. 雄花; 12. 果实。(龚朝桢绘)