

裂片的内面,微伸出;花柱条形,比雄蕊管短,柱头2,叉状分枝。胞果近球形,直径2—2.5毫米。种子肾形,棕色,光亮。花果期6—9月。

原产美洲热带,我国南北各省均有栽培。供观赏,头状花序经久不变,除用作花坛及盆景外,还可作花圈、花篮等装饰品。花序入药,有止咳定喘、平肝明目功效,主治支气管哮喘,急、慢性支气管炎,百日咳,肺结核咯血等症。

2. 银花苋 鸡冠千日红 (南京中山植物园栽培植物名录)

Gomphrena celosioides Mart. in Nov. Act. Phys.-Med. Acad. Caes.-Leop. Carol. Nat. Curios. 13 (1): 301. 1825; Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 410. 1849; Suessenguth in Repert. Sp. Nov. 35: 309. 1934; Sandw. in Kew Bull. 1946: 29. 1946; Backer in Van Steenis, Fl. Males. ser. 1, 4: 96. 1949; 海南植物志 1: 410. 1964.

本种和千日红相近,区别为:茎有贴生白色长柔毛;花序银白色;花被片花期后变硬。花果期2—6月。

产我国广东(海南岛、西沙群岛)、台湾。生在路旁草地。原产美洲热带,现分布世界各热带地区。

12 血苋属*——*Iresine* P. Br.

P. Br. Hist. Jamaica 358. 1756; Benth. et Hook. f.

Gen. Pl. 3: 42. 1880; Schinz in Engl. u. Prantl. Pflanzenfam. 3 (1a): 117. 1893 et 2. Aufl. 16c: 81. 1934.

直立草本或攀援亚灌木,无毛、有柔毛或绒毛。叶对生,全缘或有锯齿,具叶柄。花两性或单性雌雄异株,微小,单生或少数花簇成穗状花序,再排列成顶生或上部叶腋生圆锥花序;苞片及小苞片干膜质,常光亮;花被片5,干膜质,光亮,有长柔毛或近无毛,基部不变硬;雄蕊5,在雌花退化成极短不育雄蕊或不存;子房在雄花不存,在雌花侧扁,花柱极短或不存,柱头2,少数3,钻形,胚珠1,垂生。胞果球形,侧扁,不裂,膜质。种子透镜状或近肾形,种皮壳状,光亮。

约70种,分布在美洲热带、西印度群岛及大洋洲,我国有1栽培种。

1. 血苋 红叶苋(经济植物手册)、红洋苋(上海植物名录) 图版49: 1—5

Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl. in Gard. Chron. 1864: 654. 1864;

* 属的异名: 红叶苋属(经济植物手册)、红洋苋属(上海植物名录)。