

1. 腺果藤属* *Pisonia* L.

L., Sp. Pl. 1026. 1753 et Gen. Pl. 451. 1754; Heim. in Engler
u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 126. 1934.

灌木、乔木或藤状灌木。茎有刺或无刺。叶对生或互生，全缘，具柄。花单性、雌雄异株，密集成圆锥状聚伞花序；小苞片2—4；雄花花被合生成钟形或漏斗形，雄蕊6—10；雌花花被合生成卵状圆筒形或圆筒形，顶端5—10裂，子房无柄，偏斜，柱头头状或分裂。果实长圆形或棍棒状，有棱，棱角上有乳头状凸起的腺体；种子长圆形，两端略尖，具1纵深槽；胚直生，子叶弯扭，包围质柔而丰富的胚乳。

约50种，分布于热带及亚热带地区。我国有1种，产台湾和海南。

属模式种：腺果藤 *P. aculeata* L.


1. 腺果藤（中国高等植物图鉴） 避霜花（海南植物志），刺藤（台湾植物志），栖头果、猪钩搭（广东） 图版1: 1—4

Pisonia aculeata L., Sp. Pl. 1026. 1753; Choisy in DC. Prodr. 13 (2): 440. 1849; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 4: 711. 1885; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 73. 1927; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 1052. fig. 110 (8—13). 1936; Stemm. in Steenis, Fl. Males. ser. 1, 6 (3): 467. fig. 9 (d—h). 1964; 海南植物志 1: 438. 图241. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 611. 图1221. 1972; 台湾植物志 2: 302. pl. 304. 1976.

藤状灌木。树皮绿褐色，疏生柔毛或无毛；枝近对生，下垂，常具下弯的粗刺，刺长5—10毫米。叶对生，部分互生，近革质，叶片卵形至椭圆形，长3—10厘米，宽1.5—5厘米，顶端急尖或钝，基部楔形或圆形，上面暗绿色，无毛，下面淡绿色，被黄褐色短柔毛，侧脉每边4—6条；叶柄长1—1.5厘米。花单性，雌雄异株，成聚伞圆锥花序，被黄褐色短柔毛；花梗近顶端具3个卵形小苞片；花被黄色，芳香；雄花花被筒漏斗状，被微柔毛，顶端5浅裂，裂片短三角形，雄蕊6—8，伸出，花药近球形；雌花花被筒卵状圆筒形，顶端5浅裂，花柱伸出，柱头分裂。果实棍棒形，长7—14毫米，宽4毫米，5棱，具有柄的乳头状腺体和黑褐色短柔毛，具长果柄。花期1—6月。

产台湾（东南部）、海南。生于海岸灌丛和疏林。亚洲热带地区、大洋洲（澳大利亚）、非洲和美洲也有。

* 腺果藤属（中国高等植物图鉴）：避霜花属（中国植物科属检索表、海南植物志）、皮孙木属（台湾植物志）。



图版 1 1—4. 腺果藤 *Pisonia aculeata* L. : 1. 雌株花枝; 2. 雄花; 3. 雌花; 4. 果实。5—7. 胶果木 *Ceodes umbellifera* J. et G. Forst. : 5. 枝一段; 6. 花; 7. 两性花剖开。8—11. 光叶子花 *Bougainvillea glabra* Choisy : 8. 花枝一段; 9. 苞片和花; 10. 花着生在苞片上; 11. 花剖开。

(傅季平绘)